herpy

RANE FRECCIA

Kokoe Poison Frog

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia è una rana dardo velenosa diurna di 3-4 cm, originaria della costa pacifica della Colombia, nera con due strisce da verdi a dorate lungo il dorso. Gli animali selvatici portano sulla pelle un veleno letale, ma quelli nati in cattività non sono velenosi. La specie è audace, ha un richiamo forte ed è facile da riprodurre.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates aurotaenia*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-4 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Forti**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**21-24 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**8-10 mesi**
Uova per deposizione	**8-28**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un piccolo gruppo di *Phyllobates aurotaenia* ha bisogno di un terrario per foresta pluviale di almeno 60 × 45 × 45 cm per un massimo di 4 adulti.
TEMPERATURA	*Phyllobates aurotaenia* sta meglio al fresco. Di giorno ci devono essere 21-24 °C e di notte la temperatura scende a 18-21 °C. La temperatura non deve superare i 27 °C, perché il genere tollera male il caldo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. La specie tollera per breve tempo valori fino al 50 % se ha accesso all'acqua, ma una bassa umidità senza acqua può diventare rapidamente letale.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm di acqua e un sasso o un bordo inclinato, in modo che le rane possano uscire facilmente.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante. Tubi fluorescenti o luce LED da circa 6.500 K danno colori naturali e una buona crescita delle piante, e circa 12 ore di luce al giorno sono la norma.
ALIMENTAZIONE	*Phyllobates aurotaenia* mangia piccoli artropodi. I giovani prendono *Drosophila melanogaster* senza ali, mentre gli adulti mangiano volentieri insetti più grandi come *Drosophila hydei* e grillini molto piccoli.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Phyllobates aurotaenia* è diurna e audace, ma timida da giovane.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.