herpy

RANE FRECCIA

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris è una piccola rana dardo velenosa nera di 19-24 mm, con due strisce gialle, dorate o arancioni lungo il dorso. Vive sul suolo della foresta pluviale di pianura sul versante caraibico dell'America centrale, dal Nicaragua a Panama. Si vede ogni tanto in commercio, ma le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**19-24 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-3 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**7-21**
Periodo larvale	**45-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Phyllobates lugubris* sono scarse.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 21-25 °C e quella notturna di 18-21 °C, come per *Phyllobates vittatus*.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 % e il terriccio e la lettiera di foglie devono essere sempre umidi.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Le rane adulte non bevono, ma assorbono l'acqua attraverso la pelle, e basta una ciotola bassa con 1-3 cm d'acqua. *Phyllobates vittatus* apprezza una piccola zona d'acqua, e in natura i girini vengono trasportati ai corsi d'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive sul suolo della foresta, dove la luce è attenuata, e non è documentato che gli UVB siano necessari. Una debole lampada UVB nella zona 1 di Ferguson è facoltativa; in tal caso offri sempre ombra.
ALIMENTAZIONE	In natura *Phyllobates lugubris* mangia soprattutto formiche e acari. Nel terrario si offrono piccoli artropodi: moscerini della frutta privi di ali (*Drosophila melanogaster*), collemboli, piccoli isopodi e grilli appena nati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e vive nascosta tra foglie e piante. I maschi cantano da posizioni nascoste e difendono il proprio territorio dagli altri maschi, quindi più maschi nello stesso terrario possono causare stress.
AREALE D'ORIGINE	Nicaragua, Costa Rica e Panama.