herpy

RANE FRECCIA

Golden Poison Frog

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis è la più grande tra le rane freccia, 4-5 cm, e in natura uno degli animali più velenosi che si conoscano. Vive solo in un piccolo tratto di foresta pluviale sulla costa pacifica della Colombia. Gli animali nati in cattività sono praticamente privi di veleno, audaci e sempre in vista, e la specie è diventata una delle rane freccia più allevate in terrario.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**4-5 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Forti**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 50 × 50 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**16-20 mesi**
Uova per deposizione	**10-30**
Schiusa	**10-25 giorni** a 22-24 °C
Periodo larvale	**30-60 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *Phyllobates terribilis* richiede un terrario di almeno 60 × 50 × 50 cm. Un gruppo di 4-6 animali richiede almeno 90 × 50 × 50 cm, e più animali necessitano di più superficie al suolo.
TEMPERATURA	Di giorno devono esserci 21-25 °C, meglio un paio di gradi in più nella parte alta del terrario, e di notte 18-21 °C, pari alla temperatura ambiente. La temperatura non deve superare i 27 °C per periodi prolungati.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere alta, 70-100 %, ma il fondo non deve diventare paludoso. Un impianto di pioggia è la soluzione più semplice, per esempio con tre nebulizzazioni al giorno di 20-60 secondi, a seconda degli ugelli.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Metti una o più piccole ciotole d'acqua con circa 2 cm di acqua, per esempio sottovasi o mezzi gusci di noce del Brasile, da cui gli animali escano facilmente.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante. Tubi fluorescenti o barre LED per circa 12 ore al giorno bastano, e la durata del giorno può variare un po' nel corso dell'anno.
ALIMENTAZIONE	*Phyllobates terribilis* prende prede più grandi della maggior parte delle rane freccia. In natura le formiche sono l'alimento principale, ma mangia molti tipi di piccoli artropodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Phyllobates terribilis* è diurna, audace e curiosa ed è in vista per gran parte del giorno con una breve pausa a mezzogiorno.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.