herpy

RANE FRECCIA

Golfodulcean Poison Frog

Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus è una rana velenosa nera con due vistose strisce arancioni o gialle lungo il dorso e zampe marmorizzate di blu. Vive solo nella foresta di pianura attorno al Golfo Dulce, nel Costa Rica sud-occidentale. In terrario è diurna, canta volentieri ed è una riproduttrice molto attiva; il maschio trasporta da solo i girini fino all'acqua.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-4 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**8-10 mesi**
Uova per deposizione	**7-21**
Periodo larvale	**45-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Fino a quattro esemplari di *Phyllobates vittatus* necessitano di un terrario di almeno 60 × 45 × 45 cm.
TEMPERATURA	Di giorno *Phyllobates vittatus* ha bisogno di 21-25 °C e di notte di 18-21 °C, valori che la maggior parte dei soggiorni garantisce.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. La specie tollera fino al 50 % per brevi periodi se ha accesso all'acqua, ma una bassa umidità senza acqua può diventare rapidamente letale.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri una ciotola bassa o una piccola zona d'acqua con 1-2 cm di acqua e un sasso o un pezzo di corteccia, così gli animali possono uscire facilmente. Le rane si idratano nell'acqua e il maschio può usarla per deporre i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve alle piante. Bastano barre LED o tubi fluorescenti con timer per 10-12 ore al giorno, e la notte deve essere buia. Offri zone d'ombra e non collocare mai il terrario al sole diretto.
ALIMENTAZIONE	*Phyllobates vittatus* è insolita perché gli adulti accettano prede più grandi rispetto alla maggior parte delle rane velenose.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Phyllobates vittatus* è diurna e i maschi hanno un richiamo acuto e trillante. La specie può essere tenuta in coppia o in gruppo.
AREALE D'ORIGINE	Costa Rica.