herpy

RANE FRECCIA

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica è una minuscola rana dardo velenosa diurna di 16-19 mm, originaria dell'Amazzonia intorno a Iquitos in Perù e a Leticia in Colombia. È nera con strisce rosse, arancioni o gialle e marmoreggiature grigio-azzurre sulle zampe, si riproduce nelle bromelie ed è considerata una delle piccole *Ranitomeya* più facili da mantenere e riprodurre.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates amazonicus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-19 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Maturità sessuale	**5-8 mesi**
Uova per deposizione	**2-8**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo e altri girini**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un trio di *Ranitomeya amazonica* richiede un terrario di almeno 40 × 40 × 40 cm. Se le rane devono essere più numerose, calcola circa 20 litri di spazio in più per animale e scegli un terrario più alto che basso.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e 18-21 °C di notte. Le rane sono più attive e si riproducono meglio nella parte calda della gamma, a 24-26 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %, meglio 80-100 %. Nebulizza ogni giorno, preferibilmente mattina e sera, in modo che l'umidità sia vicina al 100 % dopo la nebulizzazione e scenda a circa il 70-75 % a metà giornata.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	*Ranitomeya amazonica* nuota male, quindi l'acqua deve essere bassa e facile da lasciare.
ILLUMINAZIONE E UVB	Le rane sono diurne e vivono nell'ombra della foresta. La luce serve soprattutto alle piante: offri 12-14 ore al giorno di luce LED per piante.
ALIMENTAZIONE	*Ranitomeya amazonica* è così piccola da poter mangiare solo prede minuscole.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ranitomeya amazonica* è diurna, ma spesso timida, e soprattutto i giovani si nascondono molto. In un terrario ben piantumato con molte foglie secche le rane si mostrano di più.
AREALE D'ORIGINE	Perù e Colombia.