herpy

RANE FRECCIA

Blessed Poison Frog

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta è una piccola rana freccia velenosa diurna di 16-20 mm, originaria della foresta di pianura del Perù settentrionale. La testa di un rosso vivo e il corpo nero con un reticolo blu ne fanno una delle specie più colorate del genere. Fino al 2008 era considerata una sottospecie di *Ranitomeya fantastica*. In natura è vulnerabile, ma gli animali nati in cattività si riproducono volentieri in un terrario ben allestito.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-20 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**2-6**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-114 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *R. benedicta* può essere tenuta in un terrario di 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e a 18-22 °C di notte. La specie sta meglio intorno a 21-24 °C e la temperatura non deve superare a lungo i 27 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. Un buon ritmo è quasi il 100 % mattina e sera e il 70-75 % a metà giornata, così il terrario si asciuga un po' tra una nebulizzazione e l'altra.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua nelle ascelle fogliari.
ILLUMINAZIONE E UVB	*R. benedicta* è diurna e la luce serve soprattutto alle piante. Offri 12-14 ore di luce al giorno con tubi fluorescenti o LED con timer, tutto l'anno, e buio di notte. Corrisponde alla durata del giorno ai tropici.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi vivi. Gli animali di tutte le età accettano drosofile senza ali (*Drosophila melanogaster*) e gli adulti possono mangiare anche la più grande *D. hydei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. benedicta* è diurna e può essere un po' timida, soprattutto da giovane, ma in un terrario fittamente piantumato con nascondigli gli adulti si vedono molto. Il maschio sta allo scoperto e canta.
AREALE D'ORIGINE	Perù.