herpy

RANE FRECCIA

Mimic Poison Frog

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator è una piccola rana delle frecce avvelenate diurna, di 16-20 mm, originaria del Perù settentrionale. Ogni forma locale imita un'altra rana velenosa della stessa area, e la specie è stata il primo anfibio per il quale sia stata dimostrata una vera monogamia: la coppia si occupa insieme dei piccoli e la femmina nutre ogni girino con uova non fecondate.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-20 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**5-8 mesi**
Uova per deposizione	**1-8**
Schiusa	**7-16 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo e uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Sorveglia le uova, trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *R. imitator* ha bisogno di un terrario di almeno 45 × 45 × 45 cm. Alle rane piace arrampicarsi, quindi sfrutta l'altezza.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e 18-22 °C di notte. La specie sta meglio intorno a 21-24 °C. La temperatura non deve superare a lungo i 27 °C, e oltre i 29 °C è pericoloso: il caldo è più pericoloso del freddo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. Punta a quasi il 100 % al mattino e alla sera e al 70-75 % a metà giornata, in modo che il terrario possa asciugarsi un po' tra una nebulizzazione e l'altra.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua nelle ascelle delle foglie.
ILLUMINAZIONE E UVB	*R. imitator* è diurna e vive all'ombra sotto la volta della foresta. La luce serve soprattutto alle piante. Fornisci luce LED per 12-14 ore al giorno, ad esempio dalle 8 alle 20.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi: moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*), collemboli e piccoli isopodi. Gli adulti di grandi dimensioni possono prendere anche la più grande *D. hydei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. imitator* è audace e diurna e si vede spesso allo scoperto nel terrario. Il maschio canta da postazioni fisse ed entrambi i sessi difendono il territorio della coppia dai conspecifici.
AREALE D'ORIGINE	Perù.