herpy

RANE FRECCIA

Red-backed Poison Frog

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata è una delle rane freccia più piccole: appena 13-17 mm, con dorso da rosso rame ad arancione e zampe grigio-azzurre con un disegno a rete nero. Vive nella foresta di pianura dell'Amazzonia, nel Perù nordorientale e nell'Ecuador orientale. In terrario è audace e vivace, ma impegnativa, perché le uova sono difficili da trovare e i piccoli sono difficili da portare a crescita.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates reticulatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-17 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-8**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO
Una coppia di *R. reticulata* ha bisogno di un terrario di almeno 30 × 30 × 45 cm, meglio 40 × 40 × 45 cm o più grande. Alle rane piace arrampicarsi, quindi sfrutta l'altezza.

TEMPERATURA
Mantieni il terrario a 22-26 °C di giorno e a 18-22 °C di notte. La temperatura non deve superare 27 °C per periodi prolungati e oltre 29 °C può essere letale. Il caldo è sempre più pericoloso del freddo.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE
L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. Un buon ritmo prevede quasi il 100 % al mattino e alla sera e il 70-75 % a metà giornata, così il terrario si asciuga un po' tra una nebulizzazione e l'altra.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA
Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua nelle ascelle delle foglie.

ILLUMINAZIONE E UVB
R. reticulata è diurna e la luce serve soprattutto alle piante. Fornisci 12-14 ore di luce al giorno, ad esempio LED dalle 8 alle 20, e buio di notte. Non è documentato che la specie abbia bisogno di UVB.

ALIMENTAZIONE
L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi. I giovani e la maggior parte degli adulti accettano drosofile senz'ali (*Drosophila melanogaster*), e i grandi adulti possono prendere anche la più grande *D. hydei*.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE
R. reticulata è rapidissima e audace e si vede spesso allo scoperto, come se non sapesse quanto è piccola. I maschi chiamano da postazioni fisse con un ronzio alto e breve.

AREALE D'ORIGINE
Perù e Ecuador.