herpy

RANE FRECCIA

Sira Poison Frog

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis è una piccola rana dardo velenosa diurna di 15-25 mm, originaria del Perù orientale, della Bolivia settentrionale e del Brasile più occidentale. La specie comprende le forme un tempo vendute come "lamasi" e "biolat", e la maggior parte di esse è tra le rane dardo velenose più facili da far riprodurre. Le rane stanno bene in gruppo, se c'è spazio a sufficienza.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-25 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Maturità sessuale	**5-8 mesi**
Uova per deposizione	**1-8**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**58-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un trio di *R. sirensis* richiede un terrario di almeno 45 × 45 × 45 cm.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-25 °C di giorno e 18-21 °C di notte. La temperatura non deve superare i 27 °C per periodi prolungati, e oltre i 29 °C è pericolosa.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 %. La specie tollera solo brevemente fino al 50 %, e solo se ha accesso all'acqua; un'umidità bassa senza acqua può diventare rapidamente letale.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua nelle ascelle delle foglie. Mantieni l'acqua profonda 1-2 cm, in modo che anche la rana più piccola possa starci con la testa e la parte anteriore del corpo fuori dall'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	*R. sirensis* è diurna e la luce serve soprattutto alle piante. Offri 12-14 ore di luce al giorno con tubi fluorescenti o LED e buio di notte. Non è documentato che la specie abbia bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi: moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*), collemboli e piccoli isopodi. Gli adulti accettano anche la più grande *D. hydei* e grilli appena nati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. sirensis* è spesso timida e si nasconde volentieri, quindi un terrario fittamente piantumato con molti nascondigli offre più da osservare. Il maschio canta per attirare una femmina verso un sito di deposizione.
AREALE D'ORIGINE	Bolivia, Brasile e Perù.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ranitomeya-sirensis