herpy

RANE FRECCIA

Summers' Poison Dart Frog

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi è una piccola rana freccia velenosa diurna di 16-21 mm, originaria della valle dell'Huallaga in Perù, di colore arancione o ramato con marmoreggiatura nera e una maschera nera sugli occhi. In natura è una specie minacciata, le uova sono difficili da trovare e le rane sono veloci e timide: è quindi indicata soprattutto per chi ha già esperienza con le rane freccia velenose.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-21 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 45 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-9**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un piccolo trio di *R. summersi* può essere tenuto in un terrario di almeno 30 × 30 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e a 18-21 °C di notte. La temperatura non deve superare a lungo i 27 °C, e oltre i 29 °C è letale. La specie tollera il caldo peggio del freddo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere del 70-100 %. Un buon ritmo è vicino al 100 % mattina e sera e al 70-75 % a metà giornata, così che il terrario possa asciugarsi un poco tra le nebulizzazioni.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua nelle ascelle fogliari.
ILLUMINAZIONE E UVB	*R. summersi* è diurna, e la luce serve soprattutto alle piante. Offri 12-14 ore di luce al giorno e buio di notte. Non è documentato che la specie abbia bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi vivi. I piccoli e i giovani accettano moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*), e i grandi adulti possono prendere anche la più grande *D. hydei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. summersi* è diurna, veloce e spesso timida, ma può diventare più audace quando si è abituata al terrario. Si vedono soprattutto in un terrario fittamente piantumato con nascondigli.
AREALE D'ORIGINE	Perù.