herpy

RANE FRECCIA

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii è una rana velenosa diurna molto piccola, di 13-16 mm, originaria del bacino delle Amazzoni. È nera con strisce da rosse ad arancioni, fianchi gialli e zampe blu, ed è rara in terrariofilia. La gestione si basa sull'esperienza maturata con il genere, e la specie è adatta a un allevatore esperto, paziente e con una scorta stabile di prede minuscole.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates uakarii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-16 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-6 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Uova per deposizione	**2-7**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-100 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un trio di *Ranitomeya uakarii* richiede un terrario di almeno 45 × 45 × 45 cm. La misura è presa in prestito dal genere.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-25 °C di giorno e a 18-21 °C di notte. I valori sono presi in prestito dal genere. Il calore supplementare è raramente necessario in una stanza riscaldata.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. Nebulizza ogni giorno, in modo che l'umidità sia vicina al 100 % mattina e sera e al 70-75 % a metà giornata. Così il terrario può asciugarsi un po' tra una nebulizzazione e l'altra.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua nelle ascelle delle foglie.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Ranitomeya uakarii* è diurna, e la luce serve soprattutto alle piante. Offri 12-14 ore di luce al giorno con tubi fluorescenti o LED e buio di notte. Non è documentato che la specie abbia bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi: drosofile senza ali, collemboli, piccoli isopodi bianchi e grillini appena nati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ranitomeya uakarii* è diurna.
AREALE D'ORIGINE	Brasile, Colombia e Perù.