herpy

RANE FRECCIA

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii è una piccola rana freccia velenosa diurna di 17-19 mm, originaria dell'Amazzonia occidentale. Vive sugli alberi e alleva la prole nell'acqua che si raccoglie nelle bromelie. La femmina nutre i girini con uova non fecondate.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates vanzolinii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-19 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-6 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**23-26 °C**
Temperatura, notte	**19-23 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Uova per deposizione	**1-6**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo e uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *Ranitomeya vanzolinii* richiede un terrario di almeno 40 × 40 × 40 cm, meglio 50 × 50 × 50 cm.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 23-26 °C e di notte si abbassa di 3-4 °C, a 19-23 °C. La variazione nel corso dell'anno deve essere ridotta, 1-2 °C. Non serve un punto caldo e la specie non va in pausa invernale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. Al mattino e alla sera dovrebbe essere vicina al 100 %, mentre a mezzogiorno può scendere al 70-75 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Per gli adulti una ciotola d'acqua non è necessaria, ma è un vantaggio, e può essere bassa, con 1-2 cm d'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	Il fabbisogno di luce di *Ranitomeya vanzolinii* è modesto.
ALIMENTAZIONE	*Ranitomeya vanzolinii* si nutre di piccoli artropodi vivi: moscerini della frutta, collemboli, piccoli isopodi tropicali e grilli appena nati. Gli animali piccoli richiedono prede piccole.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ranitomeya vanzolinii* è diurna, ma timida. In un terrario fittamente piantumato e con molti nascondigli si mostra più spesso che in uno arredato in modo spartano.
AREALE D'ORIGINE	Brasile e Perù.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ranitomeya-vanzolinii