herpy

RANE FRECCIA

Variable Poison Frog

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis è una piccola rana dardo velenosa diurna, lunga 15-20 mm, originaria dei versanti orientali delle Ande e dell'Amazzonia. Presenta numerose forme locali in giallo, verde e blu con disegno nero, si riproduce nelle bromelie ed è nota perché il maschio trasporta i girini tra le raccolte d'acqua della pianta. È una buona prima scelta tra le piccole rane dardo velenose.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates variabilis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-20 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Uova per deposizione	**1-10**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo e altri girini**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *R. variabilis* richiede un terrario di almeno 40 × 40 × 40 cm, e le stesse dimensioni bastano per un trio. Per ogni rana in più servono circa 4 litri di spazio aggiuntivo.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e a 18-22 °C di notte. Per breve tempo la specie tollera fino a 27 °C, ma la temperatura non deve mai superare i 29 °C. Uova e girini possono essere tenuti a 24 °C costanti.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. Punta a quasi il 100 % al mattino e alla sera e al 70-75 % a metà giornata.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri alle rane una ciotola d'acqua bassa o una piccola zona d'acqua, e mantieni l'acqua così bassa che la rana più piccola possa stare con testa e parte superiore del corpo fuori dall'acqua; la specie nuota male.
ILLUMINAZIONE E UVB	Le rane sono diurne e vivono all'ombra della foresta. La luce serve soprattutto alle piante: un'illuminazione LED di 12-14 ore al giorno è adeguata. Non è documentato che la specie abbia bisogno di UVB e normalmente non si usano.
ALIMENTAZIONE	*R. variabilis* è così piccola che può prendere solo prede minuscole: collemboli, moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*) e piccoli isopodi. Gli adulti grandi possono prendere anche *D. hydei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. variabilis* è diurna e pacifica. I maschi chiamano da posizioni elevate e in natura la specie ha un sistema di accoppiamento libero, senza coppie stabili e senza territori difesi.
AREALE D'ORIGINE	Perù, Ecuador, Colombia, Brasile e Guyana Francese.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ranitomeya-variabilis