herpy

RANE FRECCIA

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata è una piccola rana velenosa diurna, lunga meno di 18 mm, che vive nella foresta pluviale dell'Ecuador orientale, del Perù nord-orientale e della Colombia sud-orientale. In senso stretto è nera con sottili strisce rosa e un disegno a rete grigio-azzurro su zampe e ventre. Per decenni il nome è stato applicato ad altre specie nel mondo degli appassionati, per cui è importante sapere con certezza quali animali si hanno davvero.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-17 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-4**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo e altri girini**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La specie in senso stretto è quasi sconosciuta nei terrari e non esistono esperienze di mantenimento riferite proprio ad essa. I valori qui riportati sono gli stessi delle altre piccole Ranitomeya.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e 18-22 °C di notte. La temperatura non deve mai superare i 29 °C, e i terrari piccoli d'estate si scaldano rapidamente troppo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere 70-100 %: vicina al 100 % al mattino e alla sera e 70-75 % a metà giornata.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri alle rane una bassa ciotola d'acqua o una piccola zona d'acqua con 1-2 cm di acqua, in modo che la rana più piccola possa stare con testa e parte superiore del corpo fuori dall'acqua; le piccole rane velenose nuotano male.
ILLUMINAZIONE E UVB	Le rane sono diurne e vivono all'ombra della foresta. La luce serve soprattutto alle piante: 12-14 ore al giorno con illuminazione LED sono la norma.
ALIMENTAZIONE	*Ranitomeya ventrimaculata* è così piccola da poter prendere solo prede minuscole: collemboli, moscerini della frutta privi di ali (*Drosophila melanogaster*), piccoli isopodi tropicali e grilli appena nati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ranitomeya ventrimaculata* è diurna e vive soprattutto tra la lettiera del suolo forestale. I maschi chiamano con un ronzio rapido.
AREALE D'ORIGINE	Ecuador, Perù e Colombia.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ranitomeya-ventrimaculata