herpy

RANE

## Green Mantella

# *Mantella viridis*

*Mantella viridis* è una piccola rana diurna di 2-3 cm, dal verde intenso, con una maschera facciale nera e il ventre marmorizzato di blu e bianco. Vive solo nell'estremo nord del Madagascar, sopporta male il caldo ed è minacciata in natura, quindi si dovrebbero prendere in considerazione solo esemplari nati in cattività.

Famiglia: Mantellidae

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **2-3 cm**<br>lunghezza muso-cloaca |
| Aspettativa di vita | **5-8 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Terrestre** |
| Habitat | **Foresta secca e zona umida** |
| Tossine cutanee in natura | **Lievi** |
| Tossine cutanee in cattività | **Nessuna**<br>Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo |
| Difficoltà | **Principiante** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **45 × 45 × 30 cm**<br>L × P × H per 4 adulti |
| Temperatura, giorno | **20-24 °C** |
| Temperatura, notte | **17-20 °C** |
| Umidità | **60-80%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Facoltativi**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentazione | **Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)** |
| Detenzione | **In gruppo** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Sviluppo | **Girini in acqua** |
| Luogo di deposizione | **Sul terreno** |
| Uova per deposizione | **40-115** |
| Periodo larvale | **42-56 giorni**<br>dalla schiusa alla metamorfosi |
| Alimentazione delle larve | **Alghe/piante e mangime completo** |
| Cure parentali | **Nessuna** |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| IUCN | **In pericolo (EN)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | L'allestimento può essere semplice. La superficie del fondo conta più dell'altezza, perché *M. viridis* vive quasi esclusivamente a terra. |
| **TEMPERATURA** | Di giorno il terrario si mantiene a 20-24 °C, con un calo a 17-20 °C di notte. |
| **UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE** | L'umidità dell'aria si mantiene al 60-70 % di norma e fino all'80 % nel periodo riproduttivo, con più umidità in basso sul fondo e nel muschio. |
| **ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA** | Ci deve sempre essere una ciotola d'acqua bassa o una zona poco profonda, così le rane non si disidratano quando l'umidità è più bassa. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La luce serve soprattutto alle piante. Non ci sono prove che *M. viridis* abbia bisogno di UVB, ma poiché in natura la specie è attiva in zone parzialmente soleggiate, un tubo UVB debole è probabilmente un vantaggio. |
| **ALIMENTAZIONE** | *M. viridis* è un piccolo insettivoro che cattura prede minute. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | *M. viridis* è diurna e sta meglio in gruppo. Al di fuori del periodo riproduttivo gli animali sono quasi passivi gli uni verso gli altri, ma le femmine adulte possono azzuffarsi durante la riproduzione. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Madagascar. |