herpy

RANE

Hill Garden Bug-eyed Frog

Theloderma asperum

Theloderma asperum è una piccola raganella notturna delle foreste del Sud-est asiatico. Ha una colorazione bruno-nera con verruche bianche che ricordano escrementi di uccello e occhi di un profondo rosso rubino. Tollera più calore delle altre specie dello stesso genere e si trova bene in un piccolo terrario umido con una sezione acquatica. Ha un richiamo piuttosto forte e si mantiene al meglio in un piccolo gruppo.

Famiglia: Rhacophoridae Nome precedente: *Philautus asper*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-4 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e semiacquatico**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**20-24 °C**
Temperatura, notte	**17-21 °C**
Umidità	**75-95%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 5-10 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini in acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Maturità sessuale	**6-10 mesi**
Uova per deposizione	**4-15**
Schiusa	**7-14 giorni**
Periodo larvale	**75-180 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Theloderma asperum* è piccola e può essere tenuta in un terrario relativamente compatto. Un terrario di 45 × 45 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza) è adatto a un piccolo gruppo di quattro animali.
TEMPERATURA	Di giorno la temperatura deve essere di 20-24 °C, di notte 17-21 °C. La specie tollera brevemente fino a circa 10 °C e sopporta senza problemi 24-25 °C, ma oltre i 27 °C la situazione diventa pericolosa e può essere letale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria si mantiene al 75-95 %. La specie tollera brevi periodi fino a circa il 50 % se ha accesso all'acqua, ma l'aria secca senza acqua può rapidamente essere fatale.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La rana passa molto tempo vicino al bordo dell'acqua e sta persino sott'acqua, quindi la sezione acquatica non è decorativa.
ILLUMINAZIONE E UVB	La rana è notturna e non ha un bisogno documentato di UVB. Si può usare, a scelta, un tubo UVB debole per specie d'ombra (zona Ferguson 1), ma le rane devono sempre potersi ritirare all'ombra.
ALIMENTAZIONE	*T. asperum* si nutre di insetti. I grilli piccoli sono l'alimento principale, integrati con larve della tarma della cera, mosche, collemboli per i giovani più piccoli, piccole blatte dubia e larve di mosca soldato.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Theloderma asperum* è notturna e di giorno resta nascosta nei tubi, tra le piante o vicino all'acqua.
AREALE D'ORIGINE	Malaysia, Thailandia, Myanmar (Birmania), India, Bangladesh, Bhutan, Vietnam, Cambogia e Indonesia.