herpy

RANE

Tonkin Bug-eyed Frog

Theloderma corticale

Theloderma corticale è una rana notturna e semiacquatica delle foreste del Vietnam settentrionale, del Laos e della Cina meridionale. La pelle bitorzoluta, a macchie verdi e nere, assomiglia così bene a muschio e licheni che la rana quasi scompare nel terrario. Richiede un ambiente fresco e umido e non tollera il caldo, ma in compenso si riproduce con facilità.

Famiglia: Rhacophoridae Nome precedente: *Rhacophorus corticalis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**6-9 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e semiacquatico**
Habitat	**Foresta pluviale, foresta montana e terreno roccioso**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**80 × 50 × 40 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**18-23 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**80-90%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 5-10 cm
Temperatura dell'acqua	**17-22 °C**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Riposo invernale	**13-16 °C** 4-22 settimane
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini in acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Maturità sessuale	**8-10 mesi**
Uova per deposizione	**6-47**
Schiusa	**9-22 giorni**
Periodo larvale	**75-180 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Theloderma corticale* richiede un acquaterrario in cui gran parte del fondo, o tutto il fondo, sia sott'acqua.
TEMPERATURA	Il caldo è il peggior nemico della specie. Di giorno devono esserci 18-23 °C e di notte 15-20 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere alta: sopra l'80 % e mai sotto il 60 %, altrimenti le rane possono disidratarsi. Le femmine depongono le uova con l'80-90 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La parte d'acqua è la casa della specie. L'acqua deve essere profonda 5-10 cm, e va bene anche più profonda. Le rane devono poter stare nell'acqua e salire facilmente su sughero o radici.
ILLUMINAZIONE E UVB	La rana è notturna e non ha un bisogno documentato di UVB. Si può usare un tubo UVB debole per specie d'ombra (zona Ferguson 1), che dà il piccolo indice UV in grado di sostenere il ritmo circadiano, ma è facoltativo.
ALIMENTAZIONE	*T. corticale* mangia insetti: grilli ben nutriti, blatte dubia, larve della tarma della cera, larve di mosca soldato e piccoli bachi del tabacco.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Theloderma corticale* è tranquilla e di giorno si nasconde in tubi, grotte e tra le piante. Pochi minuti dopo lo spegnimento della luce diventa attiva.
AREALE D'ORIGINE	Vietnam, Laos e Cina.