herpy

SCINCHI

## Ocellated (Bronze) Skink

# *Chalcides ocellatus*

*Chalcides ocellatus* è un capace scinco vivace e diurno, diffuso nell'area mediterranea, in Nordafrica e in Medio Oriente, con corpo liscio e cilindrico, zampe piccole e ocelli bordati di chiaro sul dorso. Nuota attraverso la sabbia sciolta, partorisce piccoli vivi ed è curioso e facile da osservare. Si trova a suo agio in un terrario asciutto con fondo sabbioso, una zona di basking calda e notti umide.

Famiglia: Scincidae

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **15-30 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Peso | **22-39 g** |
| Aspettativa di vita | **10-20 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Terrestre e scavatore** |
| Habitat | **Deserto e semideserto** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **90 × 45 × 30 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **24-29 °C** |
| Punto caldo | **33-37 °C** |
| Temperatura, notte | **18-21 °C** |
| Umidità | **15-35%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentazione | **Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)** |
| Detenzione | **Singolarmente o in gruppo** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Vivipara** |
| Piccoli per parto | **2-12 piccoli** |
| Deposizioni all'anno | **1-2** |
| Gestazione | **90-120 giorni** |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Non elencata** |
| Allegato UE | **Non elencata** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Un singolo animale richiede un terrario di almeno 90 × 45 × 30 cm, e più grande è meglio. |
| **TEMPERATURA** | *Chalcides ocellatus* ama il sole e ha bisogno di un chiaro gradiente di temperatura. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve seguire il ritmo della natura: asciutta di giorno e umida di notte. Di giorno il terrario deve asciugarsi fino al 15-35 %, e di notte l'umidità può salire al 90-100 %. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è diurna e ha bisogno di luce intensa e UVB. Appartiene alla zona 2 di Ferguson, e l'indice UV deve essere 2-3 sulla zona di basking e più basso nel resto del terrario. |
| **ALIMENTAZIONE** | La specie è soprattutto insettivora e in natura prende quasi tutto ciò che riesce a sopraffare: cavallette, grilli, formiche, coleotteri, porcellini di terra, ragni, scolopendre e larve di insetti. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | *Chalcides ocellatus* è attivo e curioso, ma non è un animale da maneggiare di frequente: è liscio e veloce e sparisce facilmente se si spaventa. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Italia, Malta, Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Siria, Giordania, Israele, Territori palestinesi, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Yemen, Oman, Emirati Arabi Uniti, Turkmenistan, Pakistan, Marocco, Sahara occidentale, Mauritania, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Niger, Mali, Sudan e Ciad. |