herpy

SCINCHI

Western Blue-Tongued Lizard

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis è uno scinco robusto e terricolo dell'Australia meridionale e centrale, con bande trasversali brune sul corpo e sulla coda e la larga lingua blu che caratterizza il genere. La specie raggiunge circa 40 cm di lunghezza, è diurna e onnivora e ha bisogno di un terrario ampio con UVB e una zona di basking calda. È vivipara e si vede raramente in cattività.

Famiglia: Scincidae Nome precedente: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**35-45 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Semideserto e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-32 °C**
Punto caldo	**35-45 °C**
Temperatura, notte	**15-22 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti, frutta, piante, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Piccoli per parto	**5 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**90-120 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto ha bisogno di un terrario di almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Più grande è meglio. La superficie del fondo è più importante dell'altezza, perché l'animale vive sul terreno.
TEMPERATURA	Offri all'animale un gradiente di temperatura da 22-26 °C nella zona fresca a 28-32 °C nella zona calda. La superficie della zona di basking deve essere di 35-45 °C, e l'animale deve poter scegliere quanto caldo stare.
UMIDITÀ E ACQUA	La specie proviene da zone da aride a semiaride e non ha bisogno di un'umidità elevata. Va bene il 30-50 %, misurato nella zona fresca. Il substrato deve essere leggermente umido in profondità, ma mai bagnato.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e ha bisogno sia di UVB sia di una luce intensa. Usa un tubo T5 con UVB sopra la rete e posizionalo in modo che l'indice UV sulla zona di basking sia 3-4 (zona 3 di Ferguson).
ALIMENTAZIONE	*Tiliqua occipitalis* è onnivora e l'alimentazione va variata il più possibile.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Lo scinco è timido nei primi giorni, ma si abitua e tollera una manipolazione tranquilla.
AREALE D'ORIGINE	Australia.