herpy

SCINCHI

Spiny Skink

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae è un piccolo scinco timido della foresta pluviale di pianura della Nuova Guinea, con file di scaglie appuntite e rivolte all'indietro lungo il dorso. Vive nascosto nella lettiera umida del sottobosco, è più attivo al crepuscolo e depone un solo uovo alla volta. Si sa poco sulla gestione di questa specie in particolare, e si adatta meglio a essere un animale da osservare.

Famiglia: Scincidae Nome precedente: *Zonurus novaeguineae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-20 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Punto caldo	**27-28 °C**
Temperatura, notte	**22-24 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**36-48 mesi**
Uova per deposizione	**1 uova**
Deposizioni all'anno	**1-6**
Incubazione	**65-85 giorni** a 23-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Allegato D**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Tribolonotus novaeguineae*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 24-27 °C, e un rifugio caldo a 27-28 °C mantiene l'animale attivo, anche se non prende il sole. Di notte vanno bene 22-24 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 70-90 %, più alta di notte, e il substrato deve essere sempre umido.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è attiva al crepuscolo e non ha bisogno di una forte zona di sole, ma 12 ore di luce al giorno mantengono il ritmo circadiano.
ALIMENTAZIONE	*Tribolonotus novaeguineae* è insettivoro. L'alimentazione di base è composta da grilli, scarafaggi, lombrichi, tenebrioni e bachi da seta, mentre le larve della falena della cera e i super vermi si offrono in quantità minori.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Tribolonotus novaeguineae* è un animale da osservare e non da maneggiare. Quando viene afferrato può emettere suoni, fingersi morto, tentare la fuga o perdere la coda, e questo lo stressa.
AREALE D'ORIGINE	Indonesia e Papua Nuova Guinea.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/scinchi/tribolonotus-novaeguineae