herpy

SCINCHI

Giant Spiny Skink

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti è uno scinco raro e molto elusivo delle isole Salomone, la specie più grande del suo genere. Ha scaglie carenate e spinose e una testa angolosa e corazzata, vive nella lettiera del sottobosco, si scava una tana e può emettere dei suoni. Le cure si basano sul clima d'origine e sui parenti stretti *Tribolonotus gracilis* e *Tribolonotus novaeguineae*.

Famiglia: Scincidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**11-13 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**75 × 45 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Punto caldo	**27-28 °C**
Temperatura, notte	**22-24 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1 uova**
Incubazione	**65-85 giorni** a 23-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Dati insufficienti (DD)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Sulle cure di *Tribolonotus ponceleti* si sa molto poco. Il clima nell'areale è caldo e umido tutto l'anno e la specie vive nella lettiera del sottobosco.

TEMPERATURA

Mantieni il terrario a 24-27 °C nella zona fredda e a 27-28 °C in un nascondiglio caldo, e lascia scendere la temperatura a 22-24 °C di notte.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % di giorno e più alta di notte, preferibilmente 80-90 %, e il substrato deve restare sempre umido. Probabilmente la specie tollera molto male la disidratazione, come i parenti stretti.

ILLUMINAZIONE E UVB

L'animale è attivo al crepuscolo e di notte e il bisogno di UVB non è documentato. Nei parenti stretti gli animali possono stare senza UVB se il cibo viene integrato con calcio e vitamina D3, ma si consiglia una luce UVB debole.

ALIMENTAZIONE

In natura la specie mangia artropodi. L'alimentazione di base può comprendere grilli, scarafaggi, tarme della farina, bachi da seta, larve di mosca soldato, lombrichi e lumache.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Tribolonotus ponceleti è un animale da osservare, non da maneggiare. Gli scinchi del genere si fingono morti, cercano di fuggire, perdono la coda o emettono suoni quando vengono afferrati, e questo li stressa.

AREALE D'ORIGINE

Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.