herpy

SCINCHI

## False Poncelet's Helmet Skink

# *Tribolonotus pseudoponceleti*

*Tribolonotus pseudoponceleti* è un piccolo e schivo scinco di Bougainville e Buka, nella parte settentrionale delle Isole Salomone. Ha scaglie carenate e ruvide e una testa triangolare e vive sotto i tronchi in decomposizione, di norma in coppia. La gestione è quasi per nulla descritta e si basa quindi sullo stile di vita della specie in natura e sulle specie affini *Tribolonotus gracilis* e *Tribolonotus novaeguineae*.

Famiglia: Scincidae

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **4-7 cm**<br>lunghezza muso-cloaca |
| Aspettativa di vita | **10 anni** |
| Attività | **Al crepuscolo e di notte** |
| Stile di vita | **Terrestre** |
| Habitat | **Foresta pluviale** |
| Difficoltà | **Esperto** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **60 × 40 × 30 cm**<br>L × P × H per 2 adulti |
| Temperatura, giorno | **24-27 °C** |
| Punto caldo | **27-28 °C** |
| Temperatura, notte | **22-24 °C** |
| Umidità | **70-90%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentazione | **Insetti e vermi/lumache** |
| Detenzione | **Singolarmente o in coppia** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Uova per deposizione | **1 uova** |
| Incubazione | **65-85 giorni**<br>a 23-27 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Non elencata** |
| Allegato UE | **Non elencata** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

**IL TERRARIO**

La gestione di *Tribolonotus pseudoponceleti* è quasi per nulla descritta. La specie vive in un clima caldo e umido e si nasconde sotto i tronchi in decomposizione.

**TEMPERATURA**

Di giorno servono 24-27 °C nella parte fresca e 27-28 °C in un rifugio caldo, e di notte 22-24 °C. La specie non si mostra allo scoperto e non prende il sole, ma si scalda sotto tronchi e corteccia.

**UMIDITÀ E ACQUA**

L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % di giorno e dell'80-90 % di notte, e il fondo deve essere sempre umido, ma non fradicio; la specie predilige luoghi umidi, ma non saturi d'acqua.

**ILLUMINAZIONE E UVB**

Il fabbisogno di UVB non è documentato. Le specie affini possono cavarsela senza UVB se il cibo riceve calcio e vitamina D3, ma si consiglia una luce UVB debole.

**ALIMENTAZIONE**

La specie mangia piccoli artropodi, in cattività anche termiti. L'alimentazione di base può essere costituita da piccoli grilli, scarafaggi, camole della farina, bachi da seta, larve di mosca soldato, lombrichi e piccole lumache.

**COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE**

*Tribolonotus pseudoponceleti* è un animale da osservare e non da maneggiare. Se viene scoperta, si schiaccia piatta contro il suolo e resta ferma o si allontana lentamente; raramente tenta di fuggire.

**AREALE D'ORIGINE**

Papua Nuova Guinea.