herpy

SERPENTI

Boa constrictor

Boa constrictor è un boa robusto del Sudamerica, soprattutto a est delle Ande, di colore da marrone a grigio con marcature scure a sella e una coda che in molte forme locali è da marrone-rossastra a rossa. Raggiunge 180-300 cm, è attivo al crepuscolo e di notte e vive 20-30 anni. È più grande della specie affine *Boa imperator* e richiede un terrario ampio, pasti rari e un allevatore in grado di assumersi una responsabilità lunga decenni.

Famiglia: Boidae Nome inglese: Boa Constrictor Nome precedente: *Constrictor constrictor*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**180-300 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**20-30 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Savana, foresta secca e foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**240 × 120 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-30 °C**
Punto caldo	**30-32 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**55-75%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**18-48 mesi**
Piccoli per parto	**10-65 piccoli**
Gestazione	**100-120 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un esemplare adulto di oltre 240 cm richiede un terrario di almeno 240 × 120 × 120 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e gli adulti più piccoli, di 180-240 cm, almeno 180 × 90 × 90 cm.

TEMPERATURA

Deve esserci un gradiente da freddo a caldo. L'aria presso la zona di basking deve essere a 30-32 °C e il lato freddo a 24-26 °C, e l'intero terrario dovrebbe comprendere zone tra 24 e 32 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 55-75 % e variare un po'. Brevi periodi sopra il 70 % non fanno danno, se il terrario può poi asciugarsi, mentre un'umidità costante favorisce la muffa.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è notturna e non ha bisogno di una luce intensa, ma si consiglia la UVB. Appartiene alla zona 2 di Ferguson: esposizione solare occasionale. L'obiettivo è un indice UV di 2-3 al punto di basking.

ALIMENTAZIONE

B. constrictor è carnivoro e deve ricevere prede intere. I giovani ricevono topi e piccoli ratti, gli adulti ratti, giovani conigli, cavie, pulcini e quaglie. La varietà fa bene.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

B. constrictor è un serpente intelligente e con una sua individualità. Alcuni esemplari tollerano e gradiscono la manipolazione, altri preferiscono essere lasciati in pace.

AREALE D'ORIGINE

Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francese, Suriname, Ecuador, Perù, Bolivia, Brasile, Paraguay, Argentina e Trinidad e Tobago.