herpy

SERPENTI

African Brown House Snake

Boaedon fuliginosus

Boaedon fuliginosus è un piccolo serpente costrittore, snello e notturno, delle savane dell'Africa occidentale, dove vive spesso vicino alle abitazioni umane e si nutre di tutto, dalle lucertole ai roditori. Gli animali in commercio sono resistenti e di solito diventano tranquilli da adulti, ma hanno un riflesso alimentare molto vivace e sono abili fuggiaschi.

Famiglia: Lamprophiidae Nome precedente: *Lamprophis fuliginosus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**60-120 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Savana**
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**90 × 45 × 40 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-28 °C**
Punto caldo	**30-32 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**40-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-16 uova**
Deposizioni all'anno	**1-4**
Incubazione	**55-65 giorni** a 29-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un adulto di *B. fuliginosus* necessita di un terrario di almeno 90 × 45 × 40 cm. Più grande è sempre meglio, e le grandi femmine stanno bene in 100 × 50 × 40 cm.

TEMPERATURA

Il terrario deve avere un chiaro gradiente di temperatura. Di giorno la temperatura nel terrario è di 24-28 °C, con circa 24 °C nella zona fresca. Il punto più caldo, dove il serpente può scaldarsi, deve essere di 30-32 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 40-60 %. Nella maggior parte delle abitazioni si ottiene con una ciotola d'acqua, ed è raramente necessario nebulizzare.

ILLUMINAZIONE E UVB

B. fuliginosus è notturno e non ha bisogno di luce intensa. Un ritmo luminoso fisso di circa 12 ore di luce e 12 di buio tutto l'anno dà un chiaro ritmo circadiano.

ALIMENTAZIONE

Boaedon fuliginosus uccide la preda per costrizione, ha un forte riflesso alimentare e mangia quasi sempre. Si nutre di topi interi scongelati o piccoli ratti, mai di prede vive.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

I giovani e i subadulti possono essere veloci, inclini a mordere e irrequieti, e possono balzare fuori dal terrario come una molla quando si apre il coperchio. Apri quindi il coperchio con cautela sopra un punto sicuro.

AREALE D'ORIGINE

Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Camerun, Ciad e Repubblica Centrafricana.