herpy

SERPENTI

Amazon Basin Emerald Tree Boa

Corallus batesii

Corallus batesii è un boa slanciato e arboricolo del bacino amazzonico. Gli adulti sono verde scuro con disegni bianchi e ventre giallo, i piccoli rosso-arancio. Le femmine raggiungono circa 195 cm e gli esemplari più grandi si avvicinano ai 270 cm. Nel 2009 la specie è stata separata da *Corallus caninus*, che oggi comprende solo le popolazioni dello Scudo della Guiana. Richiede un terrario grande, alto e umido e un allevatore esperto.

Famiglia: Boidae Nome precedente: *Chrysenis batesii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**120-270 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-20 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**180 × 60 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**30-33 °C**
Temperatura, notte	**22-26 °C**
Umidità	**65-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**36-60 mesi**
Piccoli per parto	**5-25 piccoli**
Gestazione	**180-210 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un adulto richiede un terrario di almeno 180 × 60 × 120 cm (lunghezza × larghezza × altezza); più grande e soprattutto più alto è meglio, dato che *Corallus batesii* diventa più grande di *C. caninus*.

TEMPERATURA

Corallus batesii richiede un calore uniforme in tutto il terrario e una chiara zona di basking. Il punto di basking, un ramo orizzontale sotto la fonte di calore, deve essere a 30-33 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere alta e stabile, al 65-80 %. La cosa più importante è che l'umidità non oscilli bruscamente e che il terrario possa asciugarsi tra una nebulizzazione e l'altra.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è notturna e può cavarsela senza UVB, ma una debole luce UVB dà un ritmo circadiano più chiaro e garantisce la vitamina D3. La specie appartiene alla zona Ferguson 2, con un indice UV di circa 2-3 nel punto di basking.

ALIMENTAZIONE

Corallus batesii deve ricevere prede intere. I ratti sono l'alimento migliore, dai neonati di ratto da 4-6 g per i piccoli fino a ratti medi di circa 175 g per gli adulti.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Corallus batesii è di regola tranquillo di giorno e più docile di *C. caninus*, ma non è un animale da manipolazione frequente, e i giovani sono spesso nervosi e pronti a difendersi.

AREALE D'ORIGINE

Brasile, Perù, Bolivia, Ecuador e Colombia.