herpy

SERPENTI

Speckled Kingsnake

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki è un serpente reale di taglia medio-grande originario degli Stati Uniti centrali e meridionali, nero con una piccola macchia bianco-giallastra su quasi ogni scaglia, tanto che il disegno ricorda sale e pepe. Raggiunge 90-120 cm, si nutre di roditori, lucertole, rane e altri serpenti ed è robusto e facile da gestire. Si allevava singolarmente in un terrario a sviluppo orizzontale con una zona calda e umidità moderata e può vivere oltre 20 anni.

Famiglia: Colubridae Nome precedente: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**90-120 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Zona umida e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**21-28 °C**
Punto caldo	**29-32 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**40-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-15 uova**
Incubazione	**60-70 giorni** a 26-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco della gestione specifica di *Lampropeltis holbrooki*. I valori riportati qui sono ripresi dai serpenti reali in generale, in particolare da *Lampropeltis californiae* e *Lampropeltis getula*, che hanno esigenze analoghe.
TEMPERATURA	L'animale regola la propria temperatura spostandosi tra luoghi caldi e freddi, quindi il terrario deve avere un chiaro gradiente.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 40-60 %, misurata con un igrometro digitale al centro del terrario. È più alta nella zona fredda e di notte e più bassa in quella calda, ed è normale.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e in natura si espone al sole. Può cavarsela senza UVB, ma gli UVB sono consigliati per il miglior benessere. Corrisponde alla zona 2 di Ferguson.
ALIMENTAZIONE	*L. holbrooki* è carnivora e deve ricevere prede intere. I topi sono l'alimento standard e, man mano che l'animale cresce, si usano giovani ratti.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*L. holbrooki* è robusta e tollerante. Lascia un nuovo animale in pace per circa 2 settimane e comincia a manipolarlo solo quando mangia con regolarità.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti.