herpy

SERPENTI

Serpente giarrettiera comune

Thamnophis sirtalis

Thamnophis sirtalis è un serpente snello, diurno e curioso, con strisce chiare lungo il corpo. Vive in prossimità dell'acqua, dal Canada meridionale attraverso gran parte degli Stati Uniti fino al Messico settentrionale. È una specie robusta, resta attiva e ben visibile durante il giorno e può essere alimentata con topi scongelati, ma è una vera maestra di fuga e richiede un terrario completamente sigillato.

Famiglia: Colubridae Nome inglese: Common Garter Snake

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**50-100 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**6-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e semiacquatico**
Habitat	**Zona umida e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**100 × 50 × 50 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**23-27 °C**
Punto caldo	**29-32 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**35-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Riposo invernale	**8-15 °C** 8-16 settimane
Alimentazione	**Vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**18-24 mesi**
Piccoli per parto	**10-40 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**60-90 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un *Thamnophis sirtalis* adulto richiede un terrario di almeno 100 × 50 × 50 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e una femmina di oltre 80 cm ne richiede uno da 120 × 60 × 60 cm.
TEMPERATURA	Serve un gradiente termico ben definito. La zona di termoregolazione deve avere 29-32 °C misurati sulla superficie, la zona fresca 23-27 °C e la notte 18-22 °C. La fonte di calore si spegne di notte.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 35-60 %, più alta nella zona fresca e di notte. Il terrario non deve essere bagnato, perché l'umidità costante provoca vescicole sul ventre.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e prospera con una luce diurna intensa. I raggi UVB non sono strettamente necessari, ma sono consigliati e spesso rendono il serpente più attivo.
ALIMENTAZIONE	*Thamnophis sirtalis* accetta prede diverse da quelle della maggior parte dei serpenti: lombrichi, pesci e roditori. Insetti come grilli e tarme della farina non li mangia.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Thamnophis sirtalis* è veloce e curiosa e di solito diventa docile se manipolata con regolarità fin da giovane. Lascia ambientare i nuovi esemplari per circa due settimane e inizia a manipolarli solo quando mangiano regolarmente.
AREALE D'ORIGINE	Canada, Messico e Stati Uniti.