herpy

TARTARUGHE

Tartaruga dalle zampe rosse

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius è una tartaruga terrestre di taglia media e di colore scuro, originaria delle savane e dei margini forestali del Sudamerica, con scaglie da rosse ad arancioni su testa e zampe. Il carapace raggiunge tipicamente 30-35 cm di lunghezza, l'animale vive almeno 50 anni ed è una delle tartarughe terrestri tropicali più allevate. Richiede umidità elevata e calore durante tutto l'anno e si nutre di piante, frutta e un po' di cibo di origine animale.

Famiglia: Testudinidae Nome inglese: Red-Footed Tortoise Nome precedente: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-45 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**50-70 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Savana, foresta secca e foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**280 × 140 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**32-35 °C**
Temperatura, notte	**20-23 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti, frutta, piante e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**2-7 uova**
Incubazione	**105-200 giorni** a 28-31 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Non valutata (NE)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Chelonoidis carbonarius è una tartaruga attiva, che sfrutta tutto lo spazio a disposizione. Vive sul terreno, quindi la superficie del fondo conta più dell'altezza.

TEMPERATURA

In interni deve esserci un gradiente. La temperatura dell'aria è di 24-29 °C di giorno, e il punto di basking sotto la lampada riscaldante è di 32-35 °C, misurati sul substrato.

UMIDITÀ E ACQUA

La specie proviene da un clima caldo e umido e richiede un'umidità elevata: 70-90 %, con brevi picchi fino al 100 %.

ILLUMINAZIONE E UVB

C. carbonarius è diurna e ha bisogno di UVB quando non è alla luce diretta del sole. Misura un indice UV di 2,0-3,0 nel punto di basking (zona 2 di Ferguson).

ALIMENTAZIONE

C. carbonarius è onnivora e in natura mangia piante, fiori, frutta, funghi e un po' di cibo di origine animale. In cattività funziona una ripartizione di circa il 90 % di materiale vegetale e il 10 % di cibo animale.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

La specie è curiosa, attiva e relativamente tranquilla. Impara a riconoscere chi la accudisce, si avvicina volentieri quando c'è cibo e lo prende da una mano o da una pinza.

AREALE D'ORIGINE

Panama, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Francese, Brasile, Perù, Bolivia, Paraguay, Argentina e Trinidad e Tobago.