herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium è una salamandra robusta, lunga fino a 30-35 cm, originaria delle praterie, delle foreste e delle zone semidesertiche del Nord America, con bande trasversali e macchie gialle su fondo scuro. Le larve vivono in acqua, mentre gli adulti trascorrono la maggior parte della vita in gallerie scavate da loro e si mostrano di notte. Alcuni animali non si trasformano mai e diventano sessualmente maturi mantenendo le branchie.

Famiglia: Ambystomatidae

Tossine cutanee lievi

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-30 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Semideserto e bosco e prato temperati**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**50 × 25 × 30 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**18-22 °C**
Temperatura, notte	**16-20 °C**
Umidità	**80-95%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**5-36 mesi**
Uova per stagione	**100-1.000**
Schiusa	**19-50 giorni**
Periodo larvale	**75-150 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Altri larve e piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Gli adulti possono essere tenuti in molti tipi di contenitori.
TEMPERATURA	La temperatura deve essere di 18-22 °C di giorno e, preferibilmente, un po' più bassa di notte, sia per le larve sia per gli adulti. La specie sopporta il freddo meglio del caldo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	Il substrato deve essere umido, ma mai bagnato o fangoso, perché l'animale assorbe l'acqua attraverso la pelle e non beve con la bocca. L'umidità dell'aria non è stata misurata per la specie; un substrato umido dà circa l'80-95 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua bassa e pesante non è necessaria, ma è una buona sicurezza: se il substrato diventa troppo asciutto, l'animale cerca la ciotola, che così previene i decessi per disidratazione.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è notturna e non ha bisogno di una luce particolare. Non risulta che abbia bisogno di UVB, e una forte luce UV può danneggiare occhi e pelle degli anfibi.
ALIMENTAZIONE	Le larve e gli animali neotenici mangiano lombrichi, lombrichi da compost, grilli di taglia adatta, larve della tarma della cera e piccoli pesci.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli adulti scavano e restano nascosti per la maggior parte del giorno. Sono notturni e cacciatori attivi che attendono in agguato. Molti animali imparano a riconoscere chi li accudisce e chiedono cibo.
AREALE D'ORIGINE	Canada, Stati Uniti e Messico.