herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Eastern Tiger Salamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum è una salamandra robusta della metà orientale degli Stati Uniti, che misura tipicamente 15-20 cm, con macchie da gialle a verde oliva su fondo da marrone a nero. Le larve vivono in acqua, mentre gli adulti trascorrono la maggior parte della vita in gallerie scavate da loro e escono di notte. Alcuni esemplari non compiono mai la metamorfosi e raggiungono la maturità sessuale conservando le branchie.

Famiglia: Ambystomatidae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-33 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**12-20 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Bosco e prato temperati**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**50 × 25 × 30 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**18-22 °C**
Temperatura, notte	**16-22 °C**
Umidità	**80-95%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**5-48 mesi**
Uova per stagione	**100-1.000**
Schiusa	**12-50 giorni**
Periodo larvale	**75-150 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Altri larve e piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Gli adulti possono essere tenuti in molti tipi di contenitori.
TEMPERATURA	*Ambystoma tigrinum* richiede 18-22 °C di giorno, sia da larva sia da adulto, e di notte la temperatura può scendere fino a 16 °C. La specie tollera il freddo meglio del caldo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	Il substrato deve essere umido, ma mai bagnato o fangoso, perché l'animale assorbe acqua attraverso la pelle. L'umidità dell'aria non è documentata per la specie; 80-95 % è un valore preso da *Ambystoma mavortium*.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Gli adulti non hanno bisogno di una zona acquatica: sono nuotatori scarsi e possono annegare.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Ambystoma tigrinum* è notturna e non ha bisogno di un'illuminazione particolare. Non si sa che la specie abbia bisogno di UVB, e una forte luce UV può danneggiare occhi e pelle degli anfibi.
ALIMENTAZIONE	Larve ed esemplari neotenici mangiano lombrichi, lombrichi da compost, grilli di taglia adatta, larve della tarma della cera e piccoli pesci (non pesci rossi).
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli adulti scavano e restano nascosti per la maggior parte del giorno. Sono notturni e cacciano in agguato. Molti esemplari imparano a riconoscere chi li accudisce e chiedono cibo.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti.