herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Rough-skinned Newt

Taricha granulosa

Taricha granulosa è un tritone lungo 13-22 cm della costa pacifica del Nordamerica, con dorso scuro e granuloso e ventre di un arancione intenso. La pelle contiene tetrodotossina, una delle tossine più potenti tra gli anfibi, e l'animale è mortale se ingerito. La specie alterna acqua e terra, può essere mantenuta in acqua tutto l'anno e va tenuta al fresco.

Famiglia: Salamandridae Nome precedente: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans* **Tossine cutanee forti**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-22 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**12-18 anni**
Attività	**Di giorno e di notte**
Stile di vita	**Semiacquatico**
Habitat	**Zona umida e bosco e prato temperati**
Tossine cutanee	**Forti** Evita il contatto con la pelle e lavati accuratamente le mani dopo aver lavorato nel terrario
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 30 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**18-21 °C**
Temperatura, notte	**14-18 °C**
Umidità	**80-95%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 20-30 cm
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti, mangime completo e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**48-60 mesi**
Uova per stagione	**7-30**
Schiusa	**21-42 giorni**
Periodo larvale	**60-150 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Taricha granulosa è la specie più acquatica del genere. Gli animali alternano terra e acqua, alcuni per mesi o anni, ma dall'età di circa un anno possono essere mantenuti in acqua tutto l'anno.

TEMPERATURA

Taricha granulosa ama il fresco. In estate acqua e aria si mantengono a 18-21 °C. Se la temperatura sale, fino a circa 24 °C, gli animali si spostano a terra; i periodi prolungati sopra i 21 °C vanno evitati.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE

La parte emersa e i rifugi sopra l'acqua devono essere umidi, ma non fradici. L'umidità dell'aria non è stata misurata per la specie; un acquaterrario con coperchio e rifugi umidi garantisce circa l'80-95 %.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA

L'acqua deve essere profonda 20-30 cm, e un'acqua più profonda non nuoce: in un normale acquario è quasi impossibile dare alla specie troppa acqua.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie non ha bisogno di UVB. Basta la normale luce diurna della stanza o un debole tubo fluorescente durante il giorno e buio di notte. L'acquario non deve stare alla luce solare diretta e le lampade riscaldanti vanno evitate.

ALIMENTAZIONE

Taricha granulosa è un predatore opportunista. In natura mangia anfipodi, insetti, lumache, sanguisughe, girini e uova di anfibi e pesci.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

L'attività varia: alcuni animali sono visibili di giorno, altri si nascondono sotto radici e pietre e cacciano di notte. Nel periodo riproduttivo il maschio stringe la femmina nell'amplesso, che può durare da ore a diversi giorni.

AREALE D'ORIGINE

Stati Uniti e Canada.