herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Black Knobby Newt

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus è un tritone coccodrillo scuro e verrucoso di 12-15 cm, con protuberanze costali nodose e robuste creste dorsali. La specie vive nelle zone montane umide della provincia cinese del Guangxi e ha dato il nome a un intero gruppo di tritoni coccodrillo strettamente imparentati, solo di recente separati in specie distinte.

Famiglia: Salamandridae Nome precedente: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-15 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana e zona umida**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**20-24 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 1-5 cm
UVB	**Facoltativi**
Riposo invernale	**8-12 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per stagione	**30-80**
Schiusa	**20-36 giorni** a 22-24 °C
Periodo larvale	**50-110 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Altri larve e piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Quasi minacciata (NT)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Tylototriton asperrimus*.
TEMPERATURA	In estate mantieni il terrario a 20-24 °C di giorno e 18-21 °C di notte, in linea con l'estate nell'areale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria è dell'80-100 %. Nebulizza il terrario ogni giorno con uno spruzzatore e prevedi zone sia più umide sia più asciutte, in modo che l'aria non ristagni.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La parte acquatica deve avere acqua dolce e leggermente acida; vanno bene acqua piovana o acqua da osmosi. Il pH dell'acqua non è documentato per *Tylototriton asperrimus*; *Tylototriton ziegleri* è tenuto a pH 6,4-6,8.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce non ha particolare importanza per gli animali e si regola in base alle piante: strisce LED o tubi fluorescenti per 12 ore in estate e 10-11 ore in inverno.
ALIMENTAZIONE	Gli adulti ricevono circa due volte a settimana vermi delle foglie, grilli, grilli domestici, larve della tarma della cera, lombrichi e isopodi di dimensioni adeguate. In inverno mangiano in modo irregolare e molto meno.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Nelle specie strettamente imparentate gli animali vivono molto nascosti e si vedono soprattutto quando vengono nutriti o quando i maschi sono in acqua.
AREALE D'ORIGINE	Cina.