herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Guizhou Crocodile Newt

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis è un robusto tritone coccodrillo bruno-nerastro di 15-21 cm, con tre larghe strisce da arancioni a rossastre lungo il corpo. Vive a terra sulle montagne del Guizhou e dello Yunnan e frequenta l'acqua soprattutto per la riproduzione. Si mantiene al meglio in un ampio terrario con una parte di terra e una d'acqua.

Famiglia: Salamandridae Nome precedente: *Pleurodeles kweichowensis* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-21 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre e semiacquatico**
Habitat	**Foresta montana e zona umida**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**90 × 45 × 45 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**18-25 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 10-15 cm
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Uova per stagione	**50-150**
Deposizioni all'anno	**1**
Schiusa	**10-12 giorni** a 25 °C
Periodo larvale	**80-100 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Tylototriton kweichowensis* richiede un terrario ampio, perché gli animali sono grandi e pesanti, hanno bisogno di una solida area emersa con un rifugio per ciascun esemplare e di abbastanza acqua per le larve e per un filtro.
TEMPERATURA	La specie prospera a normale temperatura ambiente: 18-25 °C di giorno e 15-20 °C di notte. In estate il giorno può stare nella parte alta dell'intervallo, mentre in inverno si mantengono 15-20 °C per tutto l'arco delle 24 ore.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere alta, ma il fondo non bagnato; 70-90 % è una stima. La parte emersa va mantenuta umida senza diventare fangosa e una porzione del fondo può essere più asciutta.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La parte acquatica occupa circa metà del terrario. La profondità non è documentata per la specie; 10-15 cm è un valore preso in prestito da *Tylototriton verrucosus*.
ILLUMINAZIONE E UVB	I raggi UVB non sono necessari e la specie è più attiva al crepuscolo e di notte.
ALIMENTAZIONE	Gli adulti ricevono lombrichi tritati, grilli e altre prede di dimensioni adeguate. Le larve della tarma della cera e altre larve grasse sono molto gradite, ma non devono costituire l'alimento di base.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è lenta e maldestra. Si possono tenere insieme 2-3 animali, purché ci siano abbastanza rifugi per ciascuno.
AREALE D'ORIGINE	Cina.