herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus è un grande tritone coccodrillo di colore marrone scuro delle montagne dello Yunnan occidentale, del Myanmar settentrionale e delle zone confinanti. Raggiunge 13-24 cm ed è il più acquatico tra i tritoni coccodrillo allevati in terrario: nella stagione calda spesso resta del tutto in acqua, dove è attivo e curioso.

Famiglia: Salamandridae Nome precedente: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-24 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**12-18 g**
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Semiacquatico**
Habitat	**Foresta montana e zona umida**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 30 × 35 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**18-25 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 12-15 cm
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**12-36 mesi**
Uova per stagione	**30-200**
Schiusa	**10-12 giorni** a 25 °C
Periodo larvale	**90-150 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Altri larve e piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Quasi minacciata (NT)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Tylototriton verrucosus* si tiene al meglio in un acquaterrario. Sopra circa 18 °C la forma scura può essere tenuta interamente in acqua.
TEMPERATURA	Di giorno la temperatura deve essere di 18-25 °C, con circa 25 °C in estate, e di notte 15-20 °C. In inverno gli animali si tengono a 15-18 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria non è determinante in un allestimento ricco d'acqua; 70-90 % è una stima. Dove c'è la terra, la parte emersa si mantiene umida ma non fangosa. Fai in modo che l'aria non ristagni.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La profondità dell'acqua è di 12-15 cm. Cambia il 20-30 % dell'acqua ogni due settimane, e più spesso se ci sono molti resti di cibo.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è crepuscolare e notturna, e gli UVB non sono necessari. Una durata del giorno di circa 12 ore in estate è un buon ritmo, ma non indispensabile, e per il resto la luce deve semplicemente adattarsi alle piante.
ALIMENTAZIONE	La specie non è esigente, e le femmine grandi possono mangiare una quantità sorprendente in poco tempo.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	In acqua l'animale è attivo e curioso e può diventare piuttosto docile: nuota fino al vetro per ricevere cibo e lo prende da pinzetta e dita. Non è però adatto alla manipolazione quotidiana.
AREALE D'ORIGINE	Cina, Myanmar (Birmania), India e Thailandia.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/urodeli/tylototriton-verrucosus