herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Vietnam Crocodile Newt

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis è un tritone coccodrillo piccolo e scuro, lungo 12-17 cm, originario di pochi residui di foresta nel Vietnam settentrionale. L'animale è da nero a grigio-bruno, con dita, zampe e base della coda di un giallo vivo o rosso-arancio, e vive soprattutto sulla terraferma. La specie è stata descritta per la prima volta nel 2005 ed è vulnerabile in natura.

Famiglia: Salamandridae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-17 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**7-18 g**
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**23-25 °C**
Temperatura, notte	**23-25 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 1-5 cm
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**18 mesi**
Uova per stagione	**5-178**
Deposizioni all'anno	**1-2**
Schiusa	**28 giorni** a 22-24 °C
Periodo larvale	**60-180 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Tylototriton vietnamensis* si tiene in un terrario da foresta pluviale con una parte acquatica.
TEMPERATURA	Da marzo a ottobre il terrario si mantiene a 23-25 °C giorno e notte; una temperatura notturna distinta non è documentata. Brevi picchi sopra i 30 °C sono tollerati, ma nel terrario devono sempre esserci punti più freschi.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria è del 70-100 % nella parte calda dell'anno. Il terrario si nebulizza ogni giorno con uno spruzzino o con un impianto di pioggia; la quantità dipende dalle dimensioni e dalla ventilazione del terrario.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La parte acquatica è profonda 1-5 cm e occupa un quarto della superficie di base. L'acqua è dolce e leggermente acida (pH 6,4-6,8) come in natura. Offri sempre un'uscita facile con pietre, ghiaia o una riva piatta.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce non ha un'importanza particolare per gli animali, che non amano la luce intensa.
ALIMENTAZIONE	Gli adulti ricevono lombrichi, grilli e larve della tarma della cera; gli insetti da pasto vanno a loro volta nutriti con una dieta varia e spolverati con integratori di vitamine e minerali.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli animali cercano riparo e non amano la luce forte. I maschi scendono in acqua nel periodo riproduttivo, si schiariscono e assumono una pelle nettamente diversa, e aspettano le femmine.
AREALE D'ORIGINE	Vietnam.