herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri è un piccolo tritone coccodrillo quasi completamente nero, lungo 13-16 cm, con tre file di grosse verruche lungo il dorso e dita, zampe e parte inferiore della coda di un rosso vivo. La specie è stata descritta nel 2013, vive nascosta nelle foreste montane del Vietnam settentrionale e della Cina meridionale ed è facile da mantenere in un terrario con una piccola parte acquatica.

Famiglia: Salamandridae Nome precedente: *Yaotriton ziegleri* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-16 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**6-16 g**
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**22-24 °C**
Temperatura, notte	**20-22 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 1-5 cm
UVB	**Facoltativi**
Riposo invernale	**16-18 °C** 12-17 settimane
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per stagione	**30-80**
Schiusa	**20-36 giorni** a 20-24 °C
Periodo larvale	**50-110 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Altri larve e piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Tylototriton ziegleri* si mantiene in un terrario di tipo foresta pluviale con una piccola parte acquatica. Per tre adulti serve un terrario di almeno 60 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	Da marzo a ottobre il terrario si mantiene a 22-24 °C di giorno e 20-22 °C di notte.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria è dell'80-100 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La parte acquatica deve contenere acqua dolce, leggermente acida, con pH 6,4-6,8, ad esempio acqua piovana lasciata riposare per un po'. L'acqua è profonda al massimo 5 cm.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce non ha particolare importanza per gli animali, che non amano la luce intensa. Si regola in base alle piante: strisce LED o tubi fluorescenti per 12 ore in estate e 10-11 ore in inverno.
ALIMENTAZIONE	Gli adulti ricevono il cibo tipico per le salamandre: vermi della farina, grilli, grilli domestici, larve di tarma della cera, lombrichi e isopodi di dimensioni adeguate.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli animali sono schivi e tranquilli e si vedono soprattutto quando si nutrono o quando i maschi sono in acqua.
AREALE D'ORIGINE	Vietnam e Cina.