herpy

VARANI

Black Tree Monitor

Varanus beccarii

Un piccolo varano arboricolo nero delle isole Aru, al largo della Nuova Guinea, con coda prensile e arti anteriori insolitamente lunghi, che usa come mani quando caccia. L'animale è nervoso, richiede un terrario alto e caldo con elevata umidità ed è difficile da riprodurre, quindi è adatto solo a un allevatore esperto.

Famiglia: Varanidae Nome precedente: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**80-120 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**220-300 g**
Aspettativa di vita	**11-17 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**150 × 100 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-30 °C**
Punto caldo	**35-40 °C**
Temperatura, notte	**22-24 °C**
Umidità	**55-70%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**3 uova**
Incubazione	**157-203 giorni** a 29-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Dati insufficienti (DD)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un animale adulto richiede un terrario alto di almeno 150 × 100 × 150 cm (lunghezza × profondità × altezza), e più grande è meglio. Una coppia ha bisogno di più spazio, in modo che la femmina possa allontanarsi dal maschio.

TEMPERATURA

La temperatura diurna nel terrario deve essere di circa 26-30 °C, ma può variare da 24 a 35 °C nei diversi punti del terrario. Sotto una lampada riscaldante deve esserci una zona di basking di 35-40 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità deve essere del 55-70 % con oscillazioni nell'arco della giornata. Nebulizza il substrato ogni giorno con acqua fresca, in modo che l'umidità salga, e lascialo asciugare un po' durante la giornata.

ILLUMINAZIONE E UVB

Varanus beccarii è diurno e dovrebbe avere luce UVB. Usa una lampada combinata calore-UVB da 100-160 W sopra la zona di basking, se possibile integrata con luce del giorno filtrata.

ALIMENTAZIONE

La specie si nutre soprattutto di insetti vivi. Gli adulti ricevono scarafaggi (ad es. *Blaptica dubia*) integrati con tarme della farina, supervermи (*Zophobas morio*), grilli e larve di cetonie (*Pachnoda*).

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Varanus beccarii è nervoso e si stressa facilmente con il maneggiamento. Morsi e graffi sono un rischio reale: i denti sono lunghi, gli artigli affilati e un animale spaventato può anche scalciare e defecare su chi lo tiene.

AREALE D'ORIGINE

Indonesia.