herpy

VARANI

Golden speckled tree monitor

Varanus boehmei

Un varano arboricolo snello e nero, con macchie dorate disposte in file a V, presente solo sull'isola di Waigeo, al largo della Nuova Guinea. La specie è rara in cattività e poco conosciuta, quindi le indicazioni di allevamento qui riportate si basano su dati di parenti stretti. Richiede un terrario grande, alto e umido, nebulizzazioni quotidiane e un allevatore con esperienza.

Famiglia: Varanidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**70-90 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**150 × 100 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-30 °C**
Punto caldo	**38-45 °C**
Temperatura, notte	**22-25 °C**
Umidità	**60-90%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**3 uova**
Incubazione	**157-161 giorni** a 29-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Dati insufficienti (DD)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Varanus boehmei* è un arrampicatore, quindi l'altezza conta più della superficie del fondo.
TEMPERATURA	I valori per *Varanus boehmei* sono ripresi da *V. beccarii* e da altre specie del gruppo. Di giorno l'aria deve essere a 26-30 °C, più fresca in basso e più calda in alto, presso il punto di termoregolazione.
UMIDITÀ E ACQUA	Le specie del gruppo di *V. prasinus* si disidratano facilmente e sono più difficili da mantenere di molti altri varani.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Varanus boehmei* è probabilmente diurno e si scalda al sole in alto sugli alberi, quindi la luce significa sia calore sia UVB.
ALIMENTAZIONE	I parenti del gruppo si nutrono soprattutto di insetti e altri invertebrati, e lo stesso vale probabilmente per *Varanus boehmei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Varanus boehmei* è piccolo e di costituzione leggera, e un adulto di 70-90 cm ha artigli affilati e può mordere, ma i danni non sono paragonabili a quelli dei grandi varani.
AREALE D'ORIGINE	Indonesia.