herpy

VARANI

Bogert's Monitor

Varanus bogerti

Varanus bogerti è un varano nero e arboricolo originario delle isole al largo dell'estremità sudorientale della Nuova Guinea, e appartiene al gruppo dei varani arboricoli attorno a *Varanus prasinus*. La specie è nota solo da una manciata di esemplari di museo ed è quasi sconosciuta in cattività, quindi la gestione si basa sui parenti più stretti.

Famiglia: Varanidae Nome precedente: *Varanus prasinus bogerti*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**82-94 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**120 × 80 × 180 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-34 °C**
Punto caldo	**45-50 °C**
Temperatura, notte	**22-25 °C**
Umidità	**70-95%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**2-3 uova**
Incubazione	**157-203 giorni** a 29-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Varanus bogerti*, e la specie è quasi assente in cattività.
TEMPERATURA	Di giorno la temperatura deve essere di 24-34 °C e di notte di 22-25 °C. La temperatura superficiale nei punti di basking deve essere di 45-50 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 70-95 %. Nebulizza il terrario più volte al giorno con acqua fresca, possibilmente con un impianto automatico, e lascia asciugare un po' il fondo tra una nebulizzazione e l'altra.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e richiede luce UVB. Usa una lampada combinata di calore e UVB sopra il punto di basking, in modo che l'animale possa scegliere tra ombra e luce, e punta alla zona 2 della scala Ferguson.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione è ripresa da *V. beccarii* e *V. prasinus*, che si nutrono soprattutto di grandi artropodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è probabilmente timida e nervosa come altri varani arboricoli, e la manipolazione stressa l'animale.
AREALE D'ORIGINE	Papua Nuova Guinea.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/varani/varanus-bogerti