herpy

VARANI

Bluetail monitor

Varanus doreanus

Varanus doreanus è un varano di foresta pluviale grande e robusto, originario della Nuova Guinea e dell'Australia più settentrionale, con corpo grigio-azzurro e una coda azzurro chiaro con bande nere. L'esperienza nel mantenimento e nella riproduzione è molto limitata, e diversi dei valori indicati sono ripresi da parenti stretti.

Famiglia: Varanidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**100-135 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**300 × 150 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-33 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**24-26 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Parte acquatica**
Temperatura dell'acqua	**26-28 °C**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**4-9 uova**
Incubazione	**164-166 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Varanus doreanus* ha bisogno di un grande terrario con una vasca d'acqua in cui possa nuotare e immergersi.
TEMPERATURA	Di giorno nel terrario di *Varanus doreanus* devono esserci 26-33 °C, con una zona di basking a 40-45 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	La specie vive in foresta pluviale con circa 1.700 mm di pioggia all'anno su Cape York e più in alcune zone della Nuova Guinea. Mantieni l'umidità al 60-80 %.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e usa zone di basking, quindi si raccomanda la luce UVB e la zona 3 di Ferguson è adatta.
ALIMENTAZIONE	In natura *Varanus doreanus* si nutre di rettili, uova (soprattutto di tartaruga) e insetti come i coleotteri, e probabilmente anche di pulcini. In terrario sono adatti grandi insetti, topi, pesci e granchi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli adulti sono robusti e veloci e possono causare gravi lesioni. Il morso di un varano di un metro o più può essere profondo, gli artigli sono affilati e possono lacerare la pelle, e la coda viene usata come frusta.
AREALE D'ORIGINE	Indonesia, Papua Nuova Guinea e Australia.