herpy

VARANI

## Kimberley Rock Monitor

# *Varanus glauerti*

Un varano delle rocce snello e dalle zampe lunghe, originario del Kimberley, nell'Australia nordoccidentale, con la testa scura, ocelli grigio-azzurri sul dorso e una coda con nitide bande nere e bianche. *Varanus glauerti* raggiunge solo 60-80 cm, ma è esigente: richiede un terrario grande, caldo e alto, con superfici rocciose e fessure, e il possessore deve avere esperienza con i raggi UVB, l'incubazione delle uova e gli animali timidi.

Famiglia: Varanidae

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **60-80 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **15-20 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Arboricolo e rupicolo** |
| Habitat | **Savana e terreno roccioso** |
| Difficoltà | **Esperto** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **150 × 80 × 100 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **26-32 °C** |
| Punto caldo | **45-55 °C** |
| Temperatura, notte | **18-22 °C** |
| Umidità | **50-80%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Indispensabili**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentazione | **Insetti e vertebrati** |
| Detenzione | **Singolarmente o in coppia** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Uova per deposizione | **3-9 uova** |
| Deposizioni all'anno | **1-4** |
| Incubazione | **104-110 giorni**<br>a 28,5-29,5 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Un adulto richiede un terrario di almeno 150 × 80 × 100 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Una coppia dovrebbe avere 190 × 100 × 105 cm. |
| **TEMPERATURA** | *Varanus glauerti* si scalda molto al sole e ha bisogno di punti di termoregolazione caldi. La temperatura superficiale del punto di basking, misurata con un termometro a infrarossi, deve essere di 45-55 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve essere del 50-80 %, preferibilmente del 60-80 % per gli animali in riproduzione. Gli adulti si nebulizzano un paio di volte a settimana. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è diurna e richiede una forte luce UVB (zona 3 di Ferguson). |
| **ALIMENTAZIONE** | La specie si nutre soprattutto di insetti. Gli adulti si alimentano 3-4 volte a settimana con grilli, blatte dubia, cavallette e larve di Manduca, e ogni tanto con un topo semiadulto o un ratto neonato. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | La specie è timida e va abituata alla manipolazione lentamente. Nelle prime settimane dopo l'arrivo a casa l'animale deve essere lasciato in pace. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Australia. |

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/varani/varanus-glauerti