herpy

VARANI

Biak Emerald Monitor

Varanus kordensis

Varanus kordensis è un varano arboricolo, snello e verde, con un reticolo di macchie anulari scure, e vive solo sull'isola di Biak, a nord della Nuova Guinea. Appartiene a un gruppo di varani arboricoli noto per la difficoltà di gestione e riproduzione, e per questa specie non esistono quasi dati dettagliati sulla gestione.

Famiglia: Varanidae Nome precedente: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**70-90 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**8-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**120 × 80 × 180 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-34 °C**
Punto caldo	**45-50 °C**
Temperatura, notte	**22-25 °C**
Umidità	**75-95%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**2-5 uova**
Deposizioni all'anno	**1-3**
Incubazione	**160-190 giorni** a 28-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Dati insufficienti (DD)**

La cura in breve

IL TERRARIO

La gestione di *Varanus kordensis* è quasi la stessa degli altri varani arboricoli verdi: un terrario grande e alto con molti rifugi, rami spessi e tubi di sughero.

TEMPERATURA

Le temperature sono mutuate da *Varanus beccarii* e sono un punto di partenza prudente per *Varanus kordensis*. Di giorno la temperatura deve essere di 24-34 °C e di notte di 22-25 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere alta, circa 75-95 %, e non dovrebbe scendere sotto il 75 %. Condizioni asciutte causano disidratazione e problemi con la muta.

ILLUMINAZIONE E UVB

Varanus kordensis è diurno e prende il sole nelle chiome degli alberi. Il fabbisogno di UVB non è noto per la specie, ma i raggi UVB sono consigliati.

ALIMENTAZIONE

Varanus kordensis si nutre soprattutto di insetti. In cattività il cibo di base è composto da grilli, scarafaggi, cavallette e uova, mentre pollo, carne, gamberetti e roditori si offrono solo di tanto in tanto.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Varanus kordensis è così piccolo che un morso raramente è grave, ma gli artigli sono affilati e possono causare lacerazioni profonde, e la coda serve per aggrapparsi, non per frustare.

AREALE D'ORIGINE

Indonesia.