herpy

HAZELWORMACHTIGEN

Slow Worm

Anguis fragilis

Anguis fragilis is a legless, glossy lizard of 40-50 cm that lives hidden under stones, wood and dense vegetation in western and central Europe. It looks like a snake, but has eyelids and can shed its tail. It feeds on slugs and earthworms, gives birth to live young and can live to a great age. It needs a cool, humid enclosure or outdoor set-up with a deep substrate, many hiding places and a proper brumation.

Familie: Anguidae

KERNGEGEVENS

HET DIER

Volwassen grootte	**40-50 cm** totale lengte incl. staart
Gewicht	**20-100 g**
Levensduur	**20-30 jaar**
Actief	**Overdag en in de schemering**
Levenswijze	**Bodembewonend en gravend**
Leefgebied	**Gematigd bos en grasland**
Moeilijkheidsgraad	**Gevorderd**

VERZORGING

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H voor 2 volwassen dieren
Temperatuur overdag	**18-24 °C**
Zonneplek	**25-30 °C**
Temperatuur 's nachts	**10-15 °C**
Luchtvochtigheid	**60-80%**
Water	**Waterbak**
UVB	**Optioneel**
Winterrust	**4-8 °C** 16-20 weken
Voeding	**Insecten en wormen/slakken**
Gehouden	**In paren of één mannetje met meerdere vrouwtjes**

KWEEK

Voortplanting	**Levendbarend**
Geslachtsrijp	**36-48 maanden**
Worpgrootte	**6-12 jongen**
Legsels per jaar	**1**
Draagtijd	**80-100 dagen**

BESCHERMING EN PAPIEREN

CITES	**Niet opgenomen**
EU-bijlage	**Niet opgenomen**
IUCN	**Niet bedreigd (LC)**

Verzorging in het kort

HET TERRARIUM	Care of *Anguis fragilis* is only sparsely documented, but the species is hardy and breeds readily when conditions are right. The figures here are based on the species' way of life and climate.
TEMPERATUUR	The species does not tolerate strong heat. The daytime temperature should be 18-24 °C.
LUCHTVOCHTIGHEID EN WATER	Humidity should be 60-80 %. The substrate should be slightly damp at depth, but never wet, and the top layer may dry out a little between mistings. Mist lightly every day or every other day, and keep the moss damp.
VERLICHTING EN UVB	The species is most active in the morning and at dusk and mostly basks indirectly. UVB is therefore not necessary, but a weak UVB tube (Ferguson zone 1) over one end gives the animal the option, as long as there are many hides.
VOEDING	*Anguis fragilis* feeds on slow-moving prey and prefers small grey field slugs above all else. It also takes other slugs, earthworms, leatherjackets, maggots, spiders and small snails.
GEDRAG EN OMGANG	*Anguis fragilis* is calm and spends most of its time in the substrate or under cover, often with only the head sticking up.
NATUURLIJK VERSPREIDINGSGEBIED	Noorwegen, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Noord-Macedonië.