herpy

PIJLGIFKIKKERS

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii is a small, diurnal poison frog of 17-19 mm from the western Amazon. It lives in the trees and rears its young in water that collects in bromeliads. The female feeds the tadpoles with unfertilised eggs.

Familie: Dendrobatidae Vroegere naam: *Dendrobates vanzolinii*

KERNGEGEVENS

HET DIER

Volwassen grootte	**17-19 mm** kop-romplengte
Levensduur	**5-6 jaar**
Actief	**Overdag**
Levenswijze	**Boombewonend**
Leefgebied	**Regenwoud en bergbos**
Huidgif in het wild	**Mild**
Huidgif in gevangenschap	**Geen** Nakweekdieren. Wildvang kan het gif lang behouden
Moeilijkheidsgraad	**Gevorderd**

KWEEK

Voortplanting	**Eierleggend**
Ontwikkeling	**Kikkervisjes worden naar het water gedragen**
Legplaats	**In bladoksels (bijv. bromelia's)**
Eieren per legsel	**1-6**
Uitkomen	**10-14 dagen**
Larvenperiode	**60-80 dagen** van uitkomen tot metamorfose
Voeding van de larven	**Kant-en-klaar voer en onbevruchte eieren van het vrouwtje**
Broedzorg	**Draagt de kikkervisjes en voedt de kikkervisjes met eieren**

VERZORGING

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H voor 2 volwassen dieren
Temperatuur overdag	**23-26 °C**
Temperatuur 's nachts	**19-23 °C**
Luchtvochtigheid	**70-100%**
Water	**Waterbak** diepte 1-2 cm
UVB	**Optioneel**
Voeding	**Kleine ongewervelden (springstaarten, fruitvliegen)**
Gehouden	**In paren of in groepen**

BESCHERMING EN PAPIEREN

CITES	**Bijlage II**
IUCN	**Niet bedreigd (LC)**

Verzorging in het kort

HET TERRARIUM

A pair of *Ranitomeya vanzolinii* needs an enclosure of at least 40 × 40 × 40 cm, preferably 50 × 50 × 50 cm. The frog is arboreal and uses the height, so a tall enclosure with many vertical surfaces is better than a low, wide one.

TEMPERATUUR

The daytime temperature should be 23-26 °C, and at night it is lowered by 3-4 °C to 19-23 °C. The variation over the year should be small, 1-2 °C. A basking spot is not necessary, and the species does not hibernate.

LUCHTVOCHTIGHEID EN SPROEIEN

Humidity should be 70-100 %. Morning and evening it should be close to 100 %, and at midday it may fall to 70-75 %. The terrarium is misted daily, preferably morning and evening, with reverse-osmosis or rain water.

WATER EN WATERKWALITEIT

A water dish is not necessary for the adults, but is an advantage, and it can be shallow with 1-2 cm of water.

VERLICHTING EN UVB

The lighting requirement for *Ranitomeya vanzolinii* is modest. The frog needs enough light to see its food, and the plants need more. LED lighting for plants or a fluorescent tube, switched on 12-14 hours a day, is suitable.

VOEDING

Ranitomeya vanzolinii feeds on small, live arthropods: fruit flies, springtails, small tropical isopods and newly hatched crickets. Small animals require small feeder insects.

GEDRAG EN OMGANG

Ranitomeya vanzolinii is diurnal, but shy. In a densely planted terrarium with many hiding places it shows itself more often than in a sparsely furnished one.

NATUURLIJK VERSPREIDINGSGEBIED

Brazilië en Peru.