herpy

LANDSCHILDPADDEN EN WATERSCHILDPADDEN

Balkan Terrapin

Mauremys rivulata

Mauremys rivulata is a medium-sized, diurnal freshwater turtle from the Balkans and the eastern Mediterranean region. Females reach a shell length of about 24 cm, males about 19 cm. The species is hardy and tolerates many kinds of water, but needs a large, filtered aquatic set-up with a warm basking spot and UVB. In summer it can be kept outdoors in a secure pond.

Familie: Geoemydidae Vroegere naam: *Mauremys caspica rivulata; Emys rivulata*

KERNGEGEVENS

HET DIER

Volwassen grootte	**15-24 cm** totale lengte incl. staart
Levensduur	**20-30 jaar**
Actief	**Overdag**
Levenswijze	**Semi-aquatisch**
Leefgebied	**Moerasgebied**
Moeilijkheidsgraad	**Gevorderd**

VERZORGING

Min. terrarium	**120 × 60 × 65 cm** L × B × H voor 1 volwassen dier
Temperatuur overdag	**24-29 °C**
Zonneplek	**30-35 °C**
Temperatuur ’s nachts	**20-24 °C**
Luchtvochtigheid	**50-70%**
Water	**Aquaterrarium** diepte 25-40 cm
Watertemperatuur	**21-27 °C**
UVB	**Onmisbaar** Fergusonzone 3
Voeding	**Insecten, kant-en-klaar voer, planten, gewervelde dieren en wormen/slakken**
Gehouden	**Solitair of in paren**

KWEEK

Voortplanting	**Eierleggend**
Legselgrootte	**4-10 eieren**
Legsels per jaar	**2-3**
Incubatie	**49-77 dagen** bij 27-30 °C

BESCHERMING EN PAPIEREN

CITES	**Niet opgenomen**
EU-bijlage	**Niet opgenomen**
IUCN	**Niet beoordeeld (NE)**

Verzorging in het kort

HET TERRARIUM	Keep the animal in a large aquatic set-up, a tub or a secure pond, not in an ordinary terrarium.
TEMPERATUUR	The water should be 21-27 °C. The air above the water should be 24-29 °C, and the surface of the basking spot should reach 30-35 °C, measured with an infrared thermometer.
LUCHTVOCHTIGHEID EN WATER	The turtle's humidity is the water itself. The relative humidity of the air is not documented for the species, and 50-70 % in the room is an estimate.
WATER EN WATERKWALITEIT	The water is the animal's living space, so it must be deep, clean and warm. The water must be at least twice as deep as the shell is wide, and 25-40 cm suits adults; juveniles need lower water.
VERLICHTING EN UVB	UVB is a necessity: it enables the animal to produce vitamin D3, absorb calcium and develop a healthy shell.
VOEDING	*Mauremys rivulata* is omnivorous. In the wild, young animals are predominantly carnivorous, while adults eat more plants.
GEDRAG EN OMGANG	*Mauremys rivulata* is diurnal and shy: it dives lightning fast when disturbed. The genus is intelligent and learns to associate you with food. The animal does not like being handled.
NATUURLIJK VERSPREIDINGSGEBIED	Albanië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Israël, Palestijnse gebieden, Jordanië, Libanon, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Syrië en Turkije.