herpy

SKINKEN

Gold Skink

Eumeces schneiderii

A sturdy, smooth and fast skink from the arid regions between North Africa and Central Asia. *Eumeces schneiderii* is sand-coloured to olive-brown with orange spots, readily burrows into loose sand and is a robust, long-lived terrarium species when given sun, UVB and a deep substrate.

Familie: Scincidae Vroegere naam: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri*

KERNGEGEVENS

HET DIER

Volwassen grootte	**30-45 cm** totale lengte incl. staart
Levensduur	**15-20 jaar**
Actief	**Overdag**
Levenswijze	**Bodembewonend en gravend**
Leefgebied	**Woestijn en halfwoestijn**
Moeilijkheidsgraad	**Gevorderd**

VERZORGING

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H voor 2 volwassen dieren
Temperatuur overdag	**25-30 °C**
Zonneplek	**40-45 °C**
Temperatuur ’s nachts	**20-25 °C**
Luchtvochtigheid	**20-40%**
Water	**Waterbak**
UVB	**Onmisbaar** Fergusonzone 3
Voeding	**Insecten, fruit en gewervelde dieren**
Gehouden	**Solitair of één mannetje met meerdere vrouwtjes**

KWEEK

Voortplanting	**Eierleggend**
Legselgrootte	**5-15 eieren**
Incubatie	**40-60 dagen** bij 28-30 °C

BESCHERMING EN PAPIEREN

CITES	**Niet opgenomen**
EU-bijlage	**Niet opgenomen**
IUCN	**Niet bedreigd (LC)**

Verzorging in het kort

HET TERRARIUM

Eumeces schneiderii lives on the ground and burrows, so floor area and substrate are the most important things. A pair, or a male with two females, needs at least 120 × 60 × 45 cm (length × width × height).

TEMPERATUUR

The enclosure needs a clear gradient. By day the enclosure should be 25-30 °C, warmest near the basking spot and coolest at the opposite end.

LUCHTVOCHTIGHEID EN WATER

The species comes from arid regions and should be kept dry with a humidity of 20-40 %, and in any case below 50 %. Light misting once a week is enough.

VERLICHTING EN UVB

The species is diurnal and needs UVB for as long as the light is on. It belongs to Ferguson zone 3 and needs a UV index of about 3 at the basking spot.

VOEDING

Eumeces schneiderii is omnivorous, but eats mainly live insects and other small animals: crickets, roaches, mealworms, superworms, silkworms, snails and earthworms.

GEDRAG EN OMGANG

The species is curious and readily explores its surroundings. New animals are often cautious, but with patience and feeding from tongs they become calm. Lift the animal from below, and never grab it from above; a bite can hurt.

NATUURLIJK VERSPREIDINGSGEBIED

Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Israël, Palestijnse gebieden, Cyprus, Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Iran, Irak, Saoedi-Arabië, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Rusland, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Afghanistan en Pakistan.