herpy

AGAMER

Mwanza Flat-headed Agama

Agama mwanzae

Agama mwanzae er en dagaktiv klippeagam fra savanne og halvørken i Øst-Afrika. Den dominerende hannen har mørkeblå kropp og rødt eller fiolett hode, hals og skuldre. Arten er rask, klatrer godt og trenger et romslig, tørt terrarium med en svært varm solplass og kraftig UVB.

Familie: Agamidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-23 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-35 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-7 egg**
Inkubasjon	**60-90 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Agama mwanzae holdes og formeres i fangenskap, men stell og pleie er bare sparsomt beskrevet. Tallene for avl er hentet fra den nært beslektede *Agama agama*.

TEMPERATUR

Agama mwanzae trenger en tydelig gradient. Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 40-45 °C, målt med et infrarødt termometer. Den varme enden av terrariet skal være 30-35 °C og den kjølige enden omtrent 28 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 20-40 %. Sett alltid en lav, stabil skål med friskt vann i terrariet, og skift vannet daglig, for arten drikker mye. Spray veggene lett en eller to ganger i uken, slik at dyret også kan drikke dråper.

LYS OG UVB

Agama mwanzae er dagaktiv og soler seg mye, så den trenger kraftig lys og UVB tilsvarende Ferguson-sone 3. Bruk et T5 HO-rør på 10-12 % i en reflekterende armatur over solplassen og den varme halvdelen av terrariet.

FÔRING

Agama mwanzae er insektetere. Gi en variert kost av godt fôrede insekter: kakerlakker og sirisser som hovedfôr og melorm og superorm i mindre mengder. Fete insekter som voksmøllarver er bare til godbiter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Agama mwanzae er rask, våken og territoriell. To hanner må aldri holdes sammen, for de kjemper og påfører hverandre alvorlige skader.

NATURLIG UTBREDELSE

Tanzania, Kenya og Rwanda.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/agama-mwanzae