herpy

AGAMER

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella er en lysegrønn, svært slank trelevende agam fra skogene i Sørøst-Asia, der halen utgjør over tre fjerdedeler av lengden. Den blir 50-58 cm, er dagaktiv og jakter insekter i trærne. Den kan skifte fra klar grønn til brun når den blir urolig, og den er rask, spretten og sky.

Familie: Agamidae Engelsk: Green Crested Lizard Tidligere navn: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**50-58 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2 egg**
Inkubasjon	**47-80 dager** ved 27-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes lite kunnskap om stellet av *Bronchocela cristatella*.
TEMPERATUR	Temperaturen følger klimaet i utbredelsesområdet. Dagtemperaturen i terrariet skal ligge på 25-30 °C, og på en solplass høyt oppe på en gren skal det være 32-38 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Den relative luftfuktigheten skal ligge på 70-90 %, som i en tropisk lavlandsskog. Sprøyt terrariet grundig to ganger daglig, slik at blader og grener er våte. Dyret drikker dråper fra plantene, og en skål er ikke nødvendig.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler seg i skogkanter og lysninger, så den må ha kraftig lys og UVB. Bruk et T5 HO-rør på 6 % over solplassen, tilsvarende Ferguson-sone 2 med en UV-indeks på 2-3 ved solplassen og lavere i plantene.
FÔRING	*Bronchocela cristatella* lever av insekter som den fanger i busker og trær, blant annet flått.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er sky og blir lett stresset. Under stress blir den brun, og den kan flykte inn i løvet eller hoppe fra grenene. Den egner seg ikke til håndtering og er et dyr å se på.
NATURLIG UTBREDELSE	Malaysia, Singapore, Indonesia, Filippinene, Thailand og Brunei.