herpy

AGAMER

Calotes versicolor

Calotes versicolor er en slank, rask trelevende agam fra Sør-Asia som kan skifte farge fra brunaktig til gul, rød og nesten svart, og hannen får i yngletiden et skarpt rødt hode. Den blir 30-40 cm, er dagaktiv og lever mest av insekter. Den krever et høyt terrarium med grener, kraftig varme og UVB, og det må bare være én hann i hvert terrarium.

Familie: Agamidae Engelsk: Eastern Garden Lizard Tidligere navn: *Agama versicolor; Agama indica; Calotes cristatus; Calotes gigas; Agama tiedemanni* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**7-12 mnd.**
Kullstørrelse	**7-33 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**47-80 dager** ved 27-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *C. versicolor* trenger et terrarium på minst 120 × 60 × 120 cm (lengde × bredde × høyde). Det er en trelevende art, så høyden er like viktig som gulvarealet.

TEMPERATUR

Arten trenger en tydelig gradient. Dagtemperaturen i terrariet skal ligge på 24-29 °C, og på solplassen skal det være 35-40 °C. Om natten skal det være 21-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Den relative luftfuktigheten skal ligge på 60-80 %. Det oppnås ved å sprøyte terrariet lett en til to ganger daglig og la bunnen og plantene tørke delvis mellom sprøytingene.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg, så den trenger kraftig lys og UVB.

FÔRING

C. versicolor er først og fremst insektspiser. I naturen spiser den maur, biller, øyenstikkere, gresshopper og andre insekter, og den tar også små virveldyr som andre øgler, gekkoer og unge gnagere.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er nervøs når den er ny, men venner seg til rolige omgivelser. Den er rask og kan smette ut når lokket åpnes. Gi et nytt dyr et par uker i fred.

NATURLIG UTBREDELSE

India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodsja, Vietnam, Malaysia, Indonesia og Kina.