herpy

AGAMER

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii er en stor, trelevende agam fra det nordlige Australia og det sørlige Ny-Guinea. Den er kjent for den store hudkragen rundt halsen, som den spenner ut i et truende forsvar. Den blir 60-90 cm, er dagaktiv og lever av insekter. Til gjengjeld krever den et svært høyt terrarium, kraftig varme og UVB, og den er sky og lett å stresse.

Familie: Agamidae Engelsk: Frilled Lizard Tidligere navn: *Clamydosaurus kingii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**400-870 g**
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**150 × 75 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**23-27 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24-36 mnd.**
Kullstørrelse	**4-20 egg**
Kull per år	**2-4**
Inkubasjon	**70-110 dager** ved 28-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr må ha et terrarium på minst 150 × 75 × 150 cm (lengde × bredde × høyde). Høyden er viktigere enn gulvarealet, for arten er trelevende, og hvor høyt dyret kan sitte, gir trygghet.

TEMPERATUR
Solplassen må ligge øverst i terrariet og ha en overflatetemperatur på 38-42 °C, med omtrent 40 °C som utgangspunkt.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten må ligge på 60-70 %, og terrariet må sprøytes. Arten lever i et klima med kraftig regn om sommeren og drikker vanndråper. Et regnanlegg som kjører et par ganger om dagen, passer best.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler seg, så den trenger et kraftig lys over hele terrariet og en solplass med varme- og UVB-lys. Sett en lysstoffrørs- eller LED-lampe på 6.500 K i terrariets lengde i tillegg til varmelampene.

FÔRING
Chlamydosaurus kingii er insektseter. Fôret består av sirisser, kakerlakker, sommerfuglarver, silkeormer og enkelte supermelorm. Termitter og maur er de viktigste byttedyrene i naturen.

ATFERD OG HÅNDTERING
C. kingii er rolig og stillesittende i terrariet, men sky overfor bevegelser i rommet. Noen dyr tåler å bli tatt ut, men håndtering stresser dem lett, og dyret kan hvese, spenne ut kragen og bite.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia, Papua Ny-Guinea og Indonesia.